

聖濟總錄

三十二

庫文閣内	
三〇〇	漢
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (37)
函號	300 212



Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



© Kodak, 2007 TM: Kodak





大學東
校典藉
局之印

大德重校聖濟總錄卷第三十二
傷寒門

傷寒後身體虛腫 傷寒後不思食

傷寒後宿食不消 傷寒後不得眠

傷寒後失音不語 傷寒後餘毒攻眼

傷寒後咽喉閉塞不通

日本
醫學
圖書

總錄三十二

傷寒後身體虛腫
論曰血氣滋榮外濡於腠理則形體充實傷寒汗下之後血氣不足府藏虛寒榮衛滯滯津液不通肌肉無以充榮故令身體虛腫若脾與腎藏俱虛不能約制於水水氣流溢於皮膚則變水氣腫滿

傷寒後身體虛腫

治傷寒後身體腫滿心胸壅悶喘促氣滿黃者湯方

黃耆兩壹

枳殼

去瓢麩炒

防已

半兩

桂去麤皮

細辛

去苗葉

白朮

參分

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

參分

當歸

切焙

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑半分切



大論外望... 三十一

傷寒門

傷寒後身體虛腫
論曰血氣滋榮外濡於腠理則形體充實傷寒汗下之後血氣不足府藏虛寒榮衛滯滯津液不通肌肉無以充榮故令身體虛腫若脾與腎藏俱虛不能約制於水水氣流溢於皮膚則變水氣腫滿

煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒後身體浮腫喘息促小便不利坐臥不安防已

湯方

防已參分

豬苓去黑皮參分

海蛤兩壹

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

木香兩半

白木兩半

桑根白皮剉參分

赤茯苓去黑皮參分

檳榔剉壹兩

紫蘇莖葉兩壹

木通剉壹兩半

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半

分切煎至六分去滓不計時候溫服

治病後脾腎不足水道不利腰脚浮腫木通湯方

木通剉壹兩

桑根白皮炙黃色 澤瀉

防已

赤茯苓去黑皮

石韋去毛各參分

大腹微煨剉肆枚

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服日二

治病後氣虛津液不通皮膚虛滿防已湯方

防已

黃耆剉

桂去麤皮各壹兩半

赤茯苓去黑皮參兩

甘草炙令赤剉壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去

滓溫服日再服

治傷寒病後脾腎氣虛欲成水病四肢面目浮腫小便
澀喘急檳榔湯方

檳榔 并皮剉 伍枚 桑根白皮 剉令黃色 兩

陳橘皮 湯浸去白 焙乾參分 吳茱萸 水浸壹宿 炒乾壹分

防已 壹兩 木通 剉碎壹分 郁李人 湯浸去皮 微炒壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎取七分去

滓溫服日二

治傷寒後身體浮腫心胸滿悶不欲飲食前胡丸方

前胡 去蘆頭 壹兩 旋復花 兩 人參 參分

檳榔 剉壹兩 木香 兩 陳橘皮 湯浸去白 焙半兩

訶梨勒皮 壹兩 赤茯苓 去黑皮 參分 桑根白皮 剉參分

郁李人 湯浸去皮 尖 微炒壹兩 桂 去蠹皮 半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧

桐子大每服煎生薑棗湯下三十九日三服

治傷寒後通體洪滿腹堅脹喘急不能飲食郁李人湯

方

郁李人 湯浸去皮 尖 微炒 天黃 剉碎微炒 各壹兩

苳胡 去苗 桑根白皮 剉 澤瀉

赤芍藥 豬苓 去黑皮 桔梗 炒

麻黃 去根節 各參分 杏仁 湯浸去皮 尖 雙 人 麩炒微黃

鼈甲去裙襖 醋炙 赤茯苓去黑皮 各半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑半分切煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒病後偏身洪腫木香丸方

木香 肉豆蔻去殼 青橘皮湯浸去白

檳榔微炒剉 各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服空心溫酒下二十九漸加至三十九

傷寒後不思食

論曰傷寒後不思食者脾胃虛弱故也由汗下之後邪

氣已除穀氣未復脾胃虛弱故不思飲食

治傷寒後脾胃虛弱不思飲食人參丸方

人參 白朮 厚朴去麤皮薑汁炙各半兩

五味子 細辛去苗葉 各壹分 陳橘皮湯浸去白 焙壹兩

右六味搗羅為末煮棗肉和丸梧桐子大每服生薑湯下十五丸食前服

治傷寒後脾胃氣虛不嗜食及新虛不勝穀氣消食丸

方

小麥蘖 麴各壹升 乾薑炮

烏梅肉各肆兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸
溫湯下日再稍加至四十九

治傷寒後脾胃氣虛四肢乏力骨節煩疼口苦舌乾不
思飲食茯苓者散方

白茯苓去黑皮 芫胡去苗 陳橘皮湯浸去白焙

訶梨勒去核 桔梗炒 人參各壹兩

甘草炙 半夏湯洗去滑米

枇杷葉去毛薑汁炙 枳殼去瓢麩炒

右一十味搗羅為散每服五錢七水一盞半入生薑
一分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脾胃虛冷不入飲食理中丸方

人參 白朮 乾薑炮

甘草炙

右四味等分搗羅為末鍊蜜丸如彈丸大每服一丸
沸湯化破食前服

治傷寒後胃氣冷不思飲食人參煮散方

人參 厚朴去麤皮薑汁炙 白茯苓去黑皮各壹兩

芫胡去苗 半夏湯浸去滑米 枇杷葉去毛薑汁炙

草豆蔻去皮各半兩

右七味搗羅為散每服五錢七水一盞半入生薑一

分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒差後胃虛不入食白朮湯方

白朮

陳橘皮

湯浸去白

甘草壹分

白豆蔻

去皮

高良薑各半兩

茯苓壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎棗二枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後胃氣未和嘔吐不下食藿香湯方

藿香

竹筴

陳橘皮

湯浸去白

麥門冬

去心

枇杷葉

去毛薑汁

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分
拍碎同煎至七分去滓溫服

人參壹分

治傷寒後脾胃氣虛全不思食腹臑不調參朮湯方

人參

厚朴

去麤皮薑汁

陳橘皮

湯浸去白

訶梨勒

炮去核

桂

去麤皮

木香

枳殼

去麤皮

黃耆

剉各半兩

甘草壹分

白朮壹分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分
拍碎棗二枚擘破同煎至半盞去滓食前溫服日再

治傷寒後虛羸不思飲食六神湯方

人參去蘆 白朮三錢 黃耆剉各壹兩

枳實去穢炒 白茯苓去黑皮各半兩 甘草炙壹分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎棗三枚擘破粳米少許同煎至七分去滓食前

溫服

治傷寒後脾肺未和痰壅欲吐不思飲食參橘湯方

人參 陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

前胡去蘆 白朮湯浸去皮 杏仁湯浸去皮尖雙入炒

枇杷葉去毛薑汁炙各半兩 甘草炙壹分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食前溫服

治傷寒後胃虛不思食白朮飲方

白朮 生薑切各半兩

甘草炙壹分 一盞半煎至七分去滓再煎漸入棗干

右四味剉如麻豆以水三盞煎至一盞半去滓食前

分溫二服

治傷寒後脾胃有餘熱氣滿不能食百合飲方

百合壹分 人參壹分 豉熬

粳米淘各半合 陳橘皮湯浸去白焙半兩

薤白切伍

生薑切半

右七味剉如麻豆以水五盞煎至二盞半去滓食後

分溫三服

治傷寒後脾胃虛冷嘔逆不下食薤白飲方

薤白切伍

生薑切壹

附子炮裂去臍皮剉壹分

右三味以水一盞半煎至七分去滓再煎沸入雞子

白一枚攪勻空心溫服

傷寒後宿食不消

論曰胃受穀脾播而消之傷寒發汗吐下之後府藏俱虛氣血未復脾胃弱不能尅化飲食故令宿食不消也

其狀煩熱如瘧心胸滿脹噫氣酸臭者是也

治傷寒後胃氣虛冷宿食不消麥蘗人參丸方

大麥蘗炒黃

人參

枳殼去瓢炒

白朮各壹兩

甘草炙半兩

木香

乾薑炮裂各參分

右七味擣羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服食前溫酒下十五丸加至二十九日再

治傷寒後飲食不消腹脇虛滿堅筋倍力大麥蘗丸方

大麥蘗炒黃壹兩

白朮

人參各壹兩半

枳殼去瓢炒

檳榔剉

半夏湯洗柒遍焙

陳橘皮湯浸去白焙 薏苡人炒

乾薑炮

大黃細剉醋炒 厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

甘草炙參分

右一千二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心米飲下十五丸加至二十九日再

治傷寒後腸胃虛冷食不能化陳麴丸方

陳麴搗炒黃壹兩

乾薑炮

白朮

人參各壹兩半

甘草炙

枳殼去麤殼炒

大麥蘖炒黃

厚朴去麤皮生薑汁炙

杏人湯浸去皮尖雙入炒黃別

研各壹兩

桂去麤皮參分

右一十味除杏人外搗羅為末入杏人同研勻鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十九日再

治傷寒後新虛穀食不化消食丸方

小麥蘖炒

陳麴各壹兩

乾薑炮

烏梅肉各肆兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸溫水下日再稍加至四十丸

治傷寒後胃氣不和不能食縱食不消平胃丸方

白豆蔻去皮

枳殼去麤殼炒

白朮

人參乾 大麥蘖炒黃各壹兩 乾薑炮參

甘草炙兩 石七味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服空心煎生薑棗湯下二十九日再

治傷寒後宿食不消心腹氣脹參朮丸方

人參 白朮各壹兩 木香

陳橘皮湯浸去白焙 乾薑炮 桂去麩皮

赤茯苓去黑皮 檳榔剉 枳殼去麩炒壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服空心溫酒下五九日再

治傷寒後脾胃虛冷胸膈氣滯和五藏消宿食木香丸

方 木香 人參 白茯苓去黑皮 乾薑炮 檳榔剉 白朮 陳橘皮湯浸去白焙 訶梨勒炮去核 桂去麩皮 郁李人微炒去皮 甘草炙分 吳茱萸湯洗參遍炒乾半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧

桐子大每服空心米飲下二十九

治傷寒後宿食不消調中丸方

總錄三十一

十一

國立公文書館

National Archives of Japan

總錄三十一

十一

白朮各壹兩 高良薑各壹兩

桂去麤皮

甘草炙 人參二十斤 京三稜炮各壹兩

紅豆蔻炮各半兩 枳殼炒參分

右九味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服空心溫酒下二十九加至三十九日再

治傷寒後宿食不化助胃丸方

縮沙人 白朮

茯苓去黑皮各壹兩

紅豆蔻 甘草炙

人參

枳殼去麤殼炒各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服空心米飲下五丸日再

治傷寒後宿食不消心腹妨悶大腸不利疎氣丸方

京三稜炮各壹兩 牽牛子微炒對兩 乾薑炮半兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服空心生薑湯下二十九微利為度未利稍加

至三十九

治傷寒後宿食不消大腸氣滯大黃丸方

大黃貳兩細切炒 葶藶微炒 杏仁湯浸去皮尖雙入

朴消各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前米飲下十九以利為度

傷寒後不得眠

論曰榮衛之氣晝行於陽則寤夜行於陰則寐傷寒差後藏府皆虛榮衛出入不能循常緣熱邪未散與陽氣并衛氣獨行於陽不得入於陰則陽實陰虛故不得眠治傷寒發汗後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊懣

懣梔子豉湯方

梔子拾肆枚

香豉肆合

右二味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七

分去滓溫服一二服得吐止後服

治傷寒後虛煩不得眠心中懊懣梔子烏梅湯方

梔子八

甘草炙

黃芩去黑心各半兩

烏梅

去核炒拾肆枚

芫胡

去苗壹兩

右五味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半生薑

三片豉五十粒竹葉二七片同煎至七分去滓溫服

治傷寒吐下後心煩氣乏晝夜不得眠酸棗人湯方

酸棗人

炒壹兩

麥門冬

去心焙貳合

甘草

炙壹兩

知母

切焙半兩

白茯苓

去黑皮

芎藭

乾薑

炮各參分

右七味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

治傷寒後勞損煩躁不得眠酸棗人甘草湯方

酸棗人微炒 甘草炙

當歸切

桂去

人參

白茯苓去黑

石膏碎

芎藭各半

遠志去心

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時

治傷寒汗後虛煩不得眠睡酸棗人湯方

酸棗人微炒 人參壹

石膏碎半

赤茯苓去黑皮 桂去

知母切

甘草炙各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治傷寒後餘熱未散不得眠睡酸棗人黃芩湯方

酸棗人微炒 黃芩去黑

麥門冬去心焙

遠志去心

人參切壹

桂去

茯苓去木

甘草炙半兩

葶藶壹

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎

至一盞去滓食前溫服日再

治傷寒後虛煩不寐眠睡嘔逆梔子人湯方

梔子人壹分 芎藭兩半 酸棗人炒壹兩

陳橘皮去白炒 人參 白茯苓去黑皮各半兩

豉炒壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一大盞生薑二片煎

至七分去滓食前溫服日再

治傷寒後虛勞不得眠煩悶四肢乏力人參湯方

人參壹兩 酸棗人微炒兩 當歸焙切

芎藭兩 桂去麤皮 甘草炙

此胡去苗 赤茯苓去黑皮 石膏碎各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎

至一盞去滓食前溫服

治傷寒後虛勞煩熱驚悸不得眠睡此胡湯方

此胡去苗半兩 酸棗人微炒兩 遠志去心壹分

當歸焙切 防風去叉 甘草炙

茯苓去木 豬苓去黑皮 桂去麤皮

黃耆剉 人參 生乾地黄

芎藭 麥門冬去心焙各半兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞生薑三

片煎至七分去滓空心溫服日再

治傷寒後煩滿心神恍惚不得眠卧麥門冬茯苓飲方

麥門冬焙去心 赤茯苓去皮 知母焙

芍藥 酸棗人微炒 陳橘皮去白炒

檳榔剉 甘草炙各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑五片

煎至一盞去滓溫服日三

治傷寒後虛煩客熱累夜不得眠睡頭痛眼疼迷悶地

骨皮飲方

地骨皮洗 麥門冬去心各貳兩 酸棗人炒參兩

右三味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑五片

煎至七分去滓溫服食後服

治傷寒後膽冷不得睡梅實丸方

梅實肉 大棗肉 酸棗人炒等分

右三味同搗成膏丸如彈丸大每服一九臨卧含化

服

治大病後及虛勞不得眠酸棗人湯方

酸棗人炒 榆皮切各參兩

右二味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服

治傷寒後失音不語

論曰傷寒後失音不語者由風寒客於會厭會厭為音聲之戶邪氣傷之故卒然無音又肺主聲而通於氣人之五藏有五聲皆稟氣而通之若邪客於肺則氣道不調亦令人語無音聲治法當隨其輕重以方制之

治傷寒後外邪客於肺卒失音五味子湯方

五味子

桂去麤皮各壹兩半

杏人湯浸去皮尖雙入炒壹兩

甘草炙剉半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓不計時候溫服

治傷寒後忽暴嗽失音語不出杏人煎方

杏人湯浸去尖皮雙入研貳兩

木通剉

貝母去心

紫苑去苗土

五味子

桑根白皮切

百合各壹兩

生薑汁半兩

沙糖肆兩

蜜肆兩

右一十味除杏人薑汁糖蜜外細剉用水五盞煎至三盞去滓下杏人膏薑汁糖蜜等相和微火再煎如稀餈以淨器盛每服半匙水一盞煎開溫服不計時候

治傷寒失音不語豆竹湯方

黑豆淘洗半升

青竹如算子肆拾玖莖各長肆寸

右二味用水五大盞同煮以豆熟為度去滓分溫三服

治傷寒卒失音牙關緊急麻人飲方

大麻人升半 羚羊角屑兩

右二味麤搗篩每服五錢七酒水各一盞共煎至一盞去滓溫服日再服

治傷寒失音不知人口眼不正舌強羚羊角散方

羚羊角屑壹兩 麻黃去根節 石膏各半兩

防風去叉 麥門冬去心焙 黃芩去黑心

乾葛剉 升麻各參分

右八味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食後溫服日三

治傷寒失音不能語口噤防已湯方

防已剉 桂去麤皮 麻黃去根節

葛根剉各壹兩 甘草炙 防風去叉

芍藥各半兩

右七味麤搗篩每服五錢七水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓空心溫服日再服

治傷寒失音不語神志昏冒升麻飲方

升麻壹兩 桂去麤皮 木通剉貳兩

防風去又壹兩半

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓下竹瀝半合攪令勻空心溫服

治傷寒失音不語三瀝湯方水一盞半煎至三合

竹瀝 梨汁

荆瀝各貳合

陳醬汁半合

右四味攪令勻以綿濾過分溫四服空心日晚各一

服

治傷寒邪氣傷肺失音不語桂心湯方

桂去麤皮貳兩

菖蒲壹兩去須

右二味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓不計時候溫服衣覆取汗未退再服

治傷寒後肺中風冷失音不語芥子酒熨方

白芥子研碎

右一味用酒煮令半熟帶熱包裹熨項頸周遭冷則

易之

傷寒後餘毒攻眼

論曰五藏六府精氣皆上注於目諸脉之所屬也傷寒

差後餘毒未盡內乘於肝邪熱上衝血脉壅滯故令眼

目赤痛甚者成瘡或生翳膜遮障瞳人治宜涼肝經以

消熱毒

治傷寒後熱毒風壅攻衝眼目昏暗疼痛羚羊角湯方

羚羊角屑 決明子 芎藭 羌活

羌活去蘆頭 石膏碎各壹兩 此胡去苗

黃芩去黑心 人參各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞竹葉三七片煎

至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒後毒氣上攻眼生浮翳赤痛黃連湯方

黃連去須 黃芩去黑心 升麻各壹兩

甘草炙分 朴消研半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉三七片煎至六分去滓溫服早晚食後各一
治傷寒後毒氣攻眼目赤痛及生障翳連翹湯方

連翹 漏蘆去蘆頭 黃連去須

升麻 麻黃去節根 白欬

大黃剉 甘草炙 朴消研各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉三七片

煎至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒熱病後眼目諸疾地膚子丸方

地膚子 決明子 沙參

羚羊角屑各壹兩 秦皮 菊花

枳殼去麩炒 大黃剉炒各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後
溫水下二十九

治傷寒後眼目昏暗赤痛生瘡决明丸方

石决明 黃連去須 車前子

細辛去苗 枳殼去麩炒 梔子人

大黃剉炒 黃芩去黑心 羚羊角屑各半兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後
煎竹葉湯下二十九

治傷寒熱病後眼暗有翳及赤澀疼痛麥門冬丸方

麥門冬去心焙 澤瀉去心 茺蔚子

枸杞子各壹兩 細辛去苗葉半兩 生乾地黄焙

枳殼去麩炒 石决明刮淨 黃連去須各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後
米飲下二十九

治傷寒後肝氣實熱日中礮痛或生翳暈犀角湯方

犀角屑各壹兩 瞿麥穗 黃芩去黑心

黃連去須 木通剉 梔子人

大黃剉炒 車前子各半兩 人參壹兩

石九味麤搗篩每服三錢七水一盞入竹葉三七片煎至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒後熱氣上衝目生瘡腎洗眼秦皮湯方

秦皮壹分竹葉壹握防風去

菊花各半菱蕤各半蕤人去殼研

右七味麤搗篩都用水二升煎取一升綿濾去滓放

溫洗眼不拘時

治傷寒後肝虛目暗視物不明或見黑花防風湯方

防風去芍藥去甘草炙

人參去茯苓去獨活去

人參去茯苓去獨活去

前胡去細辛去菊花各半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服早晚食後各一

傷寒後咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏經絡

上攻咽喉也足太陰之脉上膈俠咽而喉則肺氣之所

通故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後餘毒未盡上攻

咽喉故亦令閉塞不通也

治傷寒後咽喉閉塞疼痛六七日其人大下後脉沉遲

手足厥逆下部脉不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止
當歸湯方

當歸焙切升麻去黑心知母

萎蕤去黑心黃芩去黑心麥門冬去心焙

桂去麤皮芍藥去黑皮乾薑炮

石膏去黑皮白茯苓去黑皮甘草炙

白朮各壹分麻黃去根節壹兩

右一十四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分

去滓食後溫服日三

治熱病喉中閉塞疼痛木通湯方

木通剉羚羊角鎊芍藥

絡石各壹兩升麻貳兩射干壹兩半

杏仁湯浸去皮尖雙入半兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞入竹葉七片煎
至六分去滓食後溫服日三

治傷寒後咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上攻黃芩湯

黃芩去黑心大青 山梔子人

甘草炙剉各半兩升麻 麥門冬去心焙

右六味麤搗篩每服三錢七水一盞入竹葉七片煎

至六分去滓食後溫服日三五服

治傷寒後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上攻升麻湯方

升麻

木通剉各兩

射干

羚羊角鎊

芍藥各半兩

蘆根壹握

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服日三

治傷寒後舌根腫塞喉痺此為脾虛心熱先鍼舌下兩

邊出血次服地黃湯方

生地黄剉兩

甘草剉

大黃各半兩

升麻分

車前子兩壹

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓下朴消末一錢匕攪勻食後溫服日三

治傷寒後咽喉疼痛葛根湯方

葛根

青竹筴各壹兩

倉粳米壹合

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至六分去滓食後溫服日三

治傷寒後喉內生瘡及喉腫塞毒熱上衝升麻丸方

升麻

苦藥子

鉛丹炒

大黃生用各半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一九綿

裹嚙津化盡再服之

治傷寒時行咽喉閉塞及賊風毒氣上攻丹參煎方

丹參兩貳

蒟藿根剉

羊躑躅炒

甘菊花

莽草各半

秦艽去苗土壹兩半

牛膝去苗酒浸

羌活去蘆頭

烏頭鹽炒去皮臍

蜀椒

去目并合口炒出汗

連翹

白朮各壹兩

右一十二味咬咀如麻豆大以苦酒半升拌勻漬半

日先取油二斤鍊香熟旋旋下藥煎候白朮赤色即

下鍊了豬脂一斤更煎藥赤黑色停溫綿濾過瓷合

盛每服取如半棗大含化稍嚙之熱毒單服齒痛綿

裹嚼之嚙汁

治傷寒後咽喉不能嚙食口中生瘡積熱上攻涎出不

止地黃煎方

生地黄汁貳合

鉛丹炒壹兩

豬牙皂莢壹挺去皮酥炙

末為

白蜜貳兩

右四味和勻以瓶子盛密封頭飯上蒸一時久去滓

收之每取一匙頭含化嚙津

治傷寒後咽喉痛舌強餘熱上攻貼喉膏方

蜜半斤

甘草剉貳兩

豬脂肆兩

右三味先以豬脂與蜜鍊消後入甘草煎候甘草赤

黑色以綿瀘過瓷合收盛每取如半棗大含化嚥津
治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒熱上攻射干煎
方

射干半斤豬脂壹斤

右二味先煎豬脂沸次下射干候射干黑色以綿瀘
過瓷合盛綿裹如彈子大含化嚥津

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上衝方

藺茹

右取少許如爪甲尖內口中微嚼嚥汁

治傷寒熱病後咽喉腫痛閉塞不通毒氣上衝方

商陸根切

右炒令熱以布裏熨腫上冷復易之

治傷寒熱病後咽喉痛閉塞不通毒氣上衝方

黃明膠

右取手掌大一片以水煮軟貼頸外差

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上衝方

白礬如杏人

右以綿裹含之細細嚥汁以通為度

今以蘇氏舍之味既與古以蘇氏更

蘇氏舍古

蘇氏舍古

蘇氏舍古味既與古以蘇氏更

蘇氏舍古味既與古以蘇氏更

蘇氏舍古

蘇氏舍古

蘇氏舍古味既與古以蘇氏更

蘇氏舍古味既與古以蘇氏更

大德重校聖濟總錄卷第三十二



