


東垣試效方

二三

			一	漢
			二	書
			八	門
			一	
			九	
五	三	一		
冊	架	函	號	類

				內
				閣
				文
				庫
			一	漢
			二	書
			八	
			一	
			九	
〇	〇	二		
函	冊	架	號	類


內閣文庫	
番號	漢 12819
冊數	5(2)
函號	300 223





心下痞論

心下痞論



五常政大論云土平曰備化備化之紀其養肉其病痞陰
 所至為積飲痞隔夫痞者心下滿而不痛者是也太陰者
 濕土也主壅塞乃土來心下為痞滿也傷寒下之太早亦
 為痞乃因寒傷其榮者血也心主血邪入於本故為心
 下痞仲景立瀉心湯數方皆用黃連以瀉心下之土邪其
 效如響應梓故活人云審知是痞先用桔梗枳殼湯非用
 此專治痞也蓋因見錯下必成痞證是邪氣將陷而欲過

失
及今

胃中故先用以截散其邪氣使不至於痞先之一字預用
之意也若已成痞而用之則矣之晚矣不惟不能消痞而
及傷胃中至高之正氣則當以仲景痞滿治之經云察其
邪氣所在而調之正謂此也非止傷寒如此至於酒積雜
病下之太過亦作痞滿蓋下多則七陰亡陰者謂脾胃水
穀之陰亡也故胃之氣因虛而下陷於心之分野故致心
下痞宜升胃氣以血藥治之若全用氣藥導之則其痞益
甚而復下氣愈下降必變為中滿鼓脹皆非其治也又
有虛實之殊知實痞大便秘厚朴枳實主之虛痞大便秘
者芍藥陳皮治之如飲食取傷而為痞滿者當內消導其

腹
如

胃中空塞上逆兀兀欲吐者則宜吐之取謂在上者因而
越之也凡治痞者宜詳審焉

大消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連去須炒六錢 黃芩六錢

姜黃 白朮各一兩

人參二錢 炙甘草一錢

縮砂仁一錢 枳實麩炒黃色五錢

半夏湯泡四錢 乾生薑一錢

橘皮二錢 炒麴一錢

一方澤瀉二錢 厚朴三錢

泡洗

猪苓一钱半

右件為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五十九至七十九白湯食後下

枳實消痞丸治心下虛痞惡食懶倦開胃進食

枳實

黃連 各五錢

乾生姜 一錢

半隻麴 三錢

厚朴炙四錢

人參 三錢

炙甘草 二錢

白朮 二錢

白茯苓 二錢

麥蘖麴 二錢

右件為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三十九

苓

溫水送下不拘時候量虛實加減

黃連消痞丸治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

黃連 去須炒一兩

枳實 炒七錢

橘皮 五錢

乾生姜 二錢

半隻 九錢

黃芩 炒黃色二兩

茯苓 三錢

白朮 三錢

炙甘草 三錢

姜黃 一錢

澤瀉 一錢

猪苓 去黑皮半兩

右件為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五十九溫水送下食遠

苓

木香化滯湯治因憂氣結中脘股皮底微痛心下痞滿
不思飲食之不散常常痞氣

柴胡 四錢

橘皮 三錢

甘草 炙 五錢

半其 一兩

參

生薑 七錢

當歸 尾 二錢

木香

草豆蔻 仁 五錢

益智 三錢

紅花 半錢

枳實 麸皮炒 二錢

右件咬咀如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去
滓大溫服食遠忌酒濕麵

飲

人參 順氣散子治心下痞胃中不利

苦苧蘆

酒浸炒

人參

各三錢

甘草 炙

羌活

柴胡

獨活 各三錢

黃芩

三錢 半炒
半酒製

縮砂 仁

白豆 蔻 仁

茵蘆 酒製炒 各一錢

乾葛 一錢

青皮

石膏

厚朴 炒

半其 洗 半錢

當歸 七分

右件同為細末湯浸蒸餅為丸和均篩子內擦如米
大每服一二錢臨卧少用白湯送下

小黃丸化痰止涎除濕和胃氣治胃中不利

黃芩 一兩

乾姜 一錢半

白朮 五錢

半夏 五錢湯洗姜製

沢瀉 二錢

黃耆 三錢

陳皮 去白 三錢

青皮 三錢去白

右為細末湯浸蒸餅為丸如菜豆大每服三十至五十丸溫水送下食遠

黃芩利藹丸除胃中熱利藹上痰

生黃芩

炒黃芩 各一兩

南星 三錢

半夏 半兩

三

黃連 五錢

枳殼 三錢

白朮 二錢

陳皮 二錢

澤瀉 五錢

白礬 半錢

右件為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三十丸至五十丸溫水送下食遠忌酒濕麵

通熱防風湯清利頭目寬快胃膈夫胃中若不利者悉初於表

元氣

黃耆 三錢

甘草炙 四錢

人參 五錢

葛根 一錢半

防風 一錢

蔓荊子 半錢

比先一

右件咬咀如麻豆大分作二服每服水一盞半煎至一盞去滓臨睡溫服以夾衣服覆面目勿語須臾汗出為效此至服茶三四日少語如服茶畢亦少語言一日極效

中滿腹脹

中滿腹脹論

六元政紀論云太陰所至為中滿云太陰所至為畜滿云云諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土之化脾濕有餘睡滿食不化天為陽為熱主運化也地為陰為濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿調

腹 疝

喘

經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿臍脹支膈脘脇下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經取謂胃中寒則脹滿者是也鍼經三卷雜病第八腹滿大便不利上走胃溢咽息喝喝然取足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽寒水為脹與通評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募也正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如開鬼門潔淨府溫衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其真經氣血平陽布

神清此治之正也或曰諸脹腹大皆屬於熱者何也此乃
病機總辭假令外傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變為熱
而作胃實腹滿仲景以大承氣湯治之亦有膏梁之人濕
熱鬱於內而成脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱
脹少治之者宜詳辨之

中滿分消丸治中滿熱脹鼓腹氣脹

黃芩 刮黃色剉炒半兩或一兩一方復用一兩 黃連 去須揀淨剉炒一兩

姜黃 白朮

人參 甘草

猪苓 去皮各一兩 茯苓 去皮

勻

縮砂仁 各三錢

枳實 炒黃色 五錢

半夏 洗七次 五錢

厚朴 姜製 一兩

乾生姜

知母 剉炒 四錢

澤瀉 三錢

陳皮 三錢

右件為極細末除茯苓澤瀉生薑各另為末外共為末和白湯浸蒸餿為丸如桐子大每服一百丸焙熱以熟白湯下食遠量病大小加減

中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收

半錢

黃耆 五分

草薺 藜

厚朴 各四分

益智 三分

人參

茯苓 三分

黃連 各二分

華澄茄 二分

當歸 各二分

生薑 二錢

黃蘗 二分

吳茱萸

木香 三分

半隻 三分

柴胡 各二分

沢瀉

麻黃 不去節二分

川烏頭

青皮 二分

乾姜 二分

升麻 三分

盤便

右件如麻豆大旋秤都作一服水二盞煎至一盞
去滓稍熱服食前大忌房勞飲酒濕麵冷物
廣茂漬堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石者形如
杯大令人坐卧不能大小使澁滯上喘氣促面色痿黃
通身虛腫

厚朴 善製

草豆蔻仁 煨

益智 各半錢

生甘草

當歸尾

黃芩 去穢

黃連

廣茂 煨

柴胡 去蘆

麴炒

澤瀉 各三分

升麻

吳茱萸 湯泡

青皮 去穢

陳皮 各二分

紅花 一分

半芩 七分

如虛渴加葛根二分

右件咬咀如麻豆大都作一服水二盞先浸茱萸時

煎至一盞去滓稍熱服忌酒濕麪二服之後中滿減

半止有積塊未潰再服半芩厚朴湯

半芩厚朴湯

厚朴 八分

半芩 一錢

吳茱萸 一分

肉桂 三分

桃仁 七箇

紅花 半分

蘇木 半分

京三稜 四分

草豆蔻

蒼朮

白茯苓 各三分

沢瀉 三分

猪苓 四分

乾生薑 一分

升麻 四分

柴胡 三分

木香 二分

青皮 二分

橘皮 三分

生黃芩 三分

黃連 一分

生甘草 三分

昆布 少許

炒麴 六分

當飯尾 四分

如渴加葛根 三分

右件剉如麻豆大旋秤都作一服水先拌茶次用水
三盞煎至一盞去粗稍煎服之忌如前服此茶二服
之後前證二減一半却於前茶中加減服之

木香化滯散破滯氣治心腹滿悶

白豆蔻

橘皮

桔梗

大腹子

白茯苓 去皮各半錢

縮砂仁

人參

青皮

煨枳

木香

姜黃各二錢

白朮 二錢

炙甘草 四分

白檀 五分

藿香 五分

右件為細末每服三錢水一盞半煎至一盞稍熱服
沸湯點服亦得食前忌生冷硬物

○五積門

五積論

厥

黃帝鍼經百病始生第三云其成積者蓋飲氣生足悅之
生脛寒脛寒則血脉凝滯凝滯則寒氣上入於腸胃入於
腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積
卒然多飲食則腸滿起居不節用力過度則絡脉傷陽絡
傷則血外溢血外溢則血陰絡傷則血內溢血內溢則
後血腸胃之絡傷則血溢於腸外有寒汁沫與血相搏則
并合凝聚不得散而成積矣或外中於寒內傷於惡怒則
氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血滯裹不散津
液凝滯滲著而不去而成積矣又曰生於陰者蓋憂思傷
心重寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過

左

度若入房汗出浴則傷腎此內外三部之所生病者是也
故難經中說五積各有其名如肝之積名曰肥氣在左脇
下如覆杯脘在有動氣按之牢若痛者是也無者非也餘
積皆然治之當察其所痛以知其應有餘不足可補則補
可瀉則瀉無逆天時詳臧府之高下如寒者熱之結者散
之客者除之留者行之堅者削之消之按之摩之醎以奠
之苦以瀉之全其氣茶補之隨其所利而行之節飲食慎
起居和其中外可使畢已不然遽以大毒之劑攻之積不
能除反傷正氣終難治也醫者不可不慎
肝之積肥氣丸治積在左脇下如覆杯有頭足久不愈

令人發軟逆痞瘧連歲不已

厚朴 半兩

黃連 七錢

柴胡 二兩

椒 炒去汗 四錢

炮

巴豆霜 五分

川烏頭 炮去皮 一錢二分

乾姜 炮半錢

皂角 去皮弦子 煨一錢半

白茯苓 去皮 一錢半

廣茂 炮 二錢半

人參 去芦 二錢半

甘草 炙 三錢

昆布 二錢半

蜜 苓

右件除茯苓皂角巴豆霜外為極細末另碾茯苓皂角為細末和勻另碾巴豆霜旋々入末和勻煉蜜為

加

九如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微澇再從兩九如服周而復始積減大半勿服

治

△在後積聚依此法服以春夏茶秋冬另有加減法在各條下秋冬加厚朴半兩通前一兩減黃連一錢半若強風痼於一料中加人參茯苓神菖蒲各三錢黃連只依春夏用七錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心

煩心

黃連 去須 一兩半

厚朴 去皮薑製 半兩

人參 去芦五錢

黃芩 刮黃色三錢

桂 去皮一錢

乾姜 炮半錢

巴豆霜 五分

川烏頭 炮製去皮半錢

紅豆 二分

菖蒲 半錢

茯神 去皮木一錢

丹參 炮一錢

右件除巴豆霜外為細末另研巴豆霜旋分入末煉
蜜為丸如桐子大初服二丸每日加一丸二月加二
丸漸加至大便溏再從兩丸加服淡黃連湯送下食
遠周而後始積減太半勿服秋冬加厚朴半兩通前
秤一兩減黃連半兩即用一兩黃芩全不用

○脾之積痞氣丸在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不
收發黃疽飲食不為肌膚

厚朴 去皮四錢半

黃連 去須八錢

吳茱萸 洗三錢

黃芩 二錢

白茯苓 去皮一錢 另為末

沃瀉 一錢 另為末

川烏頭 炮製去皮半錢

人參 去芦一錢

茵蘘 酒製炒一錢半

巴豆霜 四分

乾姜 炮一錢半

白朮 二錢

縮砂仁 去皮一錢半

桂 去皮四分

川椒 炒半錢

酒

○肺之積息賁丸治右脇下覆大如杯久不已令人灑淅寒熱喘咳發肺壅

厚朴 姜製八錢
黃連 去須炒一兩三錢
乾姜 炮一錢半
桂 去皮一錢

花

巴豆霜 四分
白茯苓 去皮一錢半另末

川烏頭 炮製去皮一錢 人參 去芦二錢

川椒 炒去汗一錢半 桔梗 一錢

紫尾 去苗一錢半 白豆蔻 一錢

陳皮 一錢 青皮 半錢

京三稜 炮一錢 天門冬 一錢

苓

右件除茯苓巴豆霜旋入外為末煉蜜為丸如桐子大初服二九一日加一丸二日加二丸漸加至大便溏再從二九加服煎淡生姜湯下食遠周而後始積減大半止服秋冬加厚朴半兩通前秤一兩三錢減

兩

久不入及

黃連七錢只用六錢

○腎之積奔豚九發於小腹上至心下若豚狀或下或上無時欠又已令入喘逆骨疼少氣反治男子內結七疝女人瘕聚帶下

厚朴 善製七錢

黃連 去須效五錢

白茯苓 去皮二錢

川烏頭 炮半錢

澤瀉 二錢

苦練 酒煮三錢

玄胡 一錢半

全蝎 一錢

附子 去皮一錢

巴豆霜 四分

菖蒲 二錢

獨活 一錢

丁香 半錢

肉桂 去皮二分

蠟

用

右除巴豆霜茯苓另為末旋入外為細末煉蜜為丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便澹再從二丸加服淡鹽湯送下食前周而復始病減大半勿服秋冬加厚朴半兩通周一兩二錢如積勢堅大先服前藥不減於一料中加燒存性牡蠣三錢癩疝滯下病勿加

加減痞氣丸孟秋合治脾之積

黃芩 酒製三分

黃連 酒製三分

厚朴 一錢

半夏 半錢

益智 三分

吳茱萸 二分

紅花 半分

青皮 二分

當歸尾 二分

茯苓 二分

沢瀉 二分

麴 二分

黃芪 二分

昆布 二分

橘皮 去白 二分

熟地黄 二分

人參 二分

附子 三分

葛根 二分

甘草 炙 二分

巴豆霜 二分

右件為細末蒸餅為丸如桐子大初服二九一日加

一丸二日加二九漸加至大便澹再從二九加服煎
淡甘草湯送下食前

滯

加減息奔丸仲夏合其積為病寒熱喘咳氣上奔脈澹
失精亡血氣滿則短氣血凝泣音淡則寒熱則氣分寒
血分熱治法宜益元氣洩陰火破滯氣削其堅也

川烏頭 一錢

乾姜 一錢半

人參 二錢

厚朴 八分

黃連 一兩三錢

紫苑 一錢

巴豆霜 四分

桂枝 三錢

陣皮 一錢半

青皮 七分

苓

川椒 一錢半
茯苓 一錢半

紅花 少許
桔梗 一錢

白豆蔻 一錢

京三稜 一錢半

天門冬 去心 一錢半

一

右件為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九加至大便微瀉利為度再從二九加服煎生姜湯送下食前忌酒濕麵五辛大料物之類及生冷硬物

○治積要法

許學士云大抵治積或以所惡者攻之以所喜者誘之則

桐葉

易愈如硃砂水銀治肉積神麴麥蘖治酒積水蛭蠅蟲治

臑

血積木香換柳治氣積牽牛并遂治水積雄黃膩粉治涎

礫

積磁石已豆治食積各從其類也若用群隊之藥分其勢

反

則難取效須是認得分明是何積更兼見何證然後增加

佐使之藥不爾及有所損要在臨時通變也

○心胃及腹中諸痛門

心胃及腹中諸痛論

黃帝鍼經經脈第一云胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里也又云足太陰脾之脈其支者復從胃則咽膈注心中是動則病舌本強食則

嘔胃脘痛腹脹善噫心下急痛舉痛論云五藏卒痛何氣
使然曰經脈流行不止還周不休寒氣入經稽遲泣而不
行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛得
炆則痛立止因重感於寒則痛久矣夫心胃痛及腹中諸
痛皆因勞役過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而入客
之故卒然而作大痛經言得炆則止炆者熱也以熱治寒
治之正也然腹痛有部有藏位有高下治之者亦宜分之
如厥心痛者乃寒邪客於心包絡也前人以良姜芎藭大
辛熱之味末之酒醋調服其痛立止此折之耳真心痛者
寒邪傷其君也手足青至節甚則_且發夕死脫痛者太陰

也理中建中草豆蔻丸之類主之腹臍痛少陰也四逆湯
姜附禦寒湯之類主之少腹痛者厥陰也正陽散迴陽丹
當歸四逆之類主之雜證而痛者苦練湯酒煮當歸丸丁
香練實丸之類主之是隨高下治也更循各藏部分穴喻
而灸刺之如厥心痛者痛如錐鍼刺其心甚者脾心痛也
取之然谷大谿餘歲皆然如腹中不和而痛者以甘草芍
藥湯主之如傷寒悞下傳太陰腹滿時痛者桂枝加芍藥
湯主之痛甚者桂枝加大黃主之夏月肌熱惡熱脈洪實
而痛者黃芩芍藥湯主之又有諸虛痛者如心腸痛懷作
痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱善渴涎出面色乍青

乍白乍赤嘔吐清水者蛟蛭也以手緊按而堅持之無令
得移以鍼刺之久持之患不動乃出鍼也或局方中化參
丸及諸取患之藥量虛實用不可一例而治

草豆蔻丸治勞役致脾胃虛弱而火乘之不能滋榮心肺
上焦元氣衰敗因遇冬天腎與膀胱寒水大旺子能令母
實助肺金大旺相輔而來射心乘脾故胃脫當心而痛此
復其讎故經云大勝必大復理之常也故皮毛血脉分肉
之間元氣已絕於外又以大寒大燥二氣併乘之其人苦
惡風寒耳鳴及腰背相引胃中而痛鼻息不通不聞香臭
額寒眩痛目時眩為寒水反乘脾土痰唾沫飲食反出

腹中常痛心胃痛腹下急縮有時而痛腹不能伸大便多
瀉而少秘下氣不絕或腹中鳴胃中氣亂心煩不安而成
霍亂之意膈咽不通極則有聲鼻中氣短過寒滋甚或居
暖處方過口吸風寒則復作四肢厥逆身體沉重不能轉
側頭不可以回顧小便數而欠此脾虛之至極也

- 草豆蔻 一錢四分 麩裹燒熟去皮秤用
- 益智 八分
- 陳皮 八分
- 吳茱萸 八分 陽洗去苦焙乾秤
- 生甘草 三分
- 熟甘草 三分
- 青皮 六分
- 枇杷仁 去皮尖七分

沢瀉 一分

黄耆 八分

半夏

湯洗七次一錢

大麥蘖

炒黄一錢半

麴末 四分

姜黄 四分

當歸身 六分

人參 四分

柴胡

去苗四分或二分詳脇下痛多少加之

右十八味除桃仁另研如泥外為極細末同研湯浸

蒸餅為丸如桐子大每服二十九丸熱白湯送下旋斟

酌多少服之

善附禦寒湯治中氣不足過冬天寒氣客於脾胃之間相引兩脇縮急而痛善嚏鼻中流濁涕不止不聞香臭咳嗽

脛痛上熱如火下寒如冰頭時作陣痛或暴痛兩目中流

火視物眩暈然或耳鳴耳聾喜晴明惡陰寒夜不得安卧

胃中痰涎膈咽不通飲食失味口中沫沫牙齒動搖不能

嚼物腰膝間及尻臀膝足跖冷陰汗自出行步失力風痺

麻木小便數氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人

白帶陰戶中大痛上牽心而痛鰾黑失色男子控睪而痛

牽心腹陰陰而痛面如赭色食少大小便不調煩心霍亂

逆氣裏急而腹皮白或黑下氣腹中腸鳴膝下筋急及腰

背肩胛大痛此陰盛陽虛之證也

乾姜炮一錢三分

半夏

湯洗五分

裏

葉

紫胡 去苗一錢

防風 去芦半錢

羌活 一錢

藜本 去土八分

人參 去芦半錢

白葵花 五朵去心萼

甘草 炙八分

升麻 七分

郁李仁 湯浸去皮尖

當歸身 六分酒製

桃仁 湯浸去皮尖半錢與郁李仁研如泥入正茶

黑附子 炮去皮臍四錢

無

右件咬咀都作一服水五大盞煎至三盞入黃耆一錢橘皮五分草豆蔻一錢再煎至二盞再入酒製黃藥三分酒製黃連三分枳殼三分酒地黃二分此四

頰嚙

鼓

味剉碎預一日先用新水多半盞浸一宿煎至一盞半又華陰細辛一分貫芎二分蔓荊子二分亦預先一日用新水各另浸將前正茶去滓入此三味再上火同煎至一盞去粗空心熱服之待少時以美饌啜之忌肉湯宜食肉不助經絡中火邪也又能治嚙根強硬其效如神如無已上證但有白帶下臍下寒男子二丸冷痛相引心腹背痛手心或寒兩尺脉弦細按之不設小便遺失或數而欠大便多燥澀不通或大便軟溺色變或短氣不足以息額寒鼻不聞香臭鼻端紅腫善嚏多悲愁不樂健忘多怒寢汗憎風

裏

小便滑數後餘有瀝臍下冷疾風寒汗出腰背強腰痛
或裏急或腹皮白或腹黑色或鼻流清涕及目中淚
下不止精神不足亦宜服之及腎與膀胱經中寒肺
氣寒元氣不足者皆宜服之於月生月滿時隔三五
日喫一服如病急不拘時候

麻黃豆蔻丸治客寒犯胃心胃大痛不可忍季秋合

麻黃 不去節三錢 草豆蔻 五錢

益智仁 八分 炒麴 二錢

升麻 半錢 半隻 半錢湯洗

麥蘖麴 半錢 縮砂仁 半錢

黃耆 半錢

白朮 半錢

橘皮 去白

柴胡

炙甘草

吳茱萸

當歸身 各五分

青皮

木香 二分

厚朴 二分

華澄茄 四分

紅花 三分

蘇木 三分

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三十九細
嚼溫水送下如寒腹痛不嚼白湯送下
益智和中丸治心胃腹中大痛煩燥冷汗自出

草豆蔻 四錢

縮砂仁 七分

黃耆

當歸身

麥門冬

橘皮 各半錢

桂花 一錢

黃連 二分

姜黃 五分

益智仁 二錢二分

甘草 炙二錢半

人參

乾生姜

麴末

桂枝 一錢半

麥蘖麴 各三錢

生地黄 二分

木香 二分

右件同為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三十

丸溫水送下細嚼亦得

益智調中湯治因服寒藥過多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻 三分

縮砂仁

姜黃 三分

陳皮 七分

黃耆 七分

人參 二分

益智仁 三分

甘草 二分

厚朴 二分

沢瀉 三分

乾姜 三分

右件為齏末都作一服水一盞半煎至一盞去滓溫服食前

常

如胃脘当心而痛气欲绝者胃中虚之至極俗呼為心痛與草薹藪丸二三十丸若痛頻作胃中元氣虛甚則將理二三日不得食熱當食溫爛細嚼細嚥痛必不作一二日自和矣若食熱稠粥其痛必幾死言畢不得食食後不得言欲食時口鼻不得當風食罷亦然忌生冷硬物果木之類及麩粉麩食須忌長遠免致後患

東垣試效方卷第二

東垣試效方卷第三

○嘔吐噦門

嘔吐噦論

黃帝鍼經第二經脉第一足太陰脾之脉復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔脉解篇云取謂食則嘔者物盛滿而上溢故也舉痛論云寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔厥陰之病少腹堅滿厥心痛嘔吐飲食不入入而復出筋骨掉眩清厥甚則入脾食痺而吐靈樞經云人之噦蓋穀入於胃胃氣上注於肺因有故寒氣與新穀氣俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣併相逆復出於胃

故為噦補乎太陰瀉足少陰又云胃為氣逆為噦夫嘔吐
噦者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳如嘔
者陽明也陽明多血多氣故有聲有物血氣俱病也仲景
云嘔多雖有陽明證慎不可下孫真人云嘔家多服生薑
為嘔家之聖藥也氣逆者必散之故以生薑為主吐者太
陽也太陽多血少氣故有物無聲為血病也有食入則吐
以橘皮去白主之噦者少陽少陽多氣少血故有聲無物
乃氣病也以薑製半夏為主故朱奉議治嘔吐噦以生薑
橘皮半夏者是也究其三者之源皆因脾胃虛弱或因寒
氣客胃加之飲食取傷而致之也宜以丁香藿香半夏

苓陳皮生薑之類主之若但有內傷而有此病宜察其虛
實使內消之痰飲者必下之治之者當分其經對證用藥
而不可亂

丁香安胃湯治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香 半錢

吳茱萸 一錢

草豆蔻

黃耆 二錢

人參 一錢

炙甘草 半錢

柴胡 半錢

升麻 七分

當歸身 一錢半

橘皮 半錢

黃蘗 三錢

蒼朮 一錢

右件判如麻豆大每服半兩水二大盞煎至一盞去粗稍熱服食前

茯苓半隻湯治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白朮 茯苓

半隻 炒麴各一錢

大麥麵半兩 陳皮各三錢

天麻三錢

右件咬咀每服半兩水二大盞生姜五片煎至一盞去滓稍熱服食前

柴胡半隻湯治舊有風證不敢見風眼淚頭痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難舉居暖處有微汗便減再見風其病即便復一名補肝湯

半夏二錢 炒麴一錢

生姜十片 柴胡半錢

升麻五分 蒼朮一錢

藁本半錢 白茯苓七分

右件咬咀麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服

木香刺膈丸治寒在膈上噎塞咽膈不調

利通

吳茱萸 一錢二分

草豆蔻 壹錢貳分

益智 捌分

橘皮 捌分

白僵蚕 肆分

人參 捌分

黃耆 捌分

升麻 捌分

麥蘗 壹錢半

當歸 陸分

炙甘草 陸分

半夏 壹錢

木香 貳分

澤瀉 肆分

姜黃 肆分

柴胡 肆分

青皮 貳分

右件為細末湯浸蒸餅為丸如菜豆大每服二十九

溫水少許送下勿多飲湯恐速走下細嚼亦得

○衄吐嘔唾血門

衄吐嘔唾血論

厥

別論云陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血又云足陽明胃之脉起於鼻又云溫淫汗出衄又云陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥又云怒則氣逆甚則嘔血故氣上矣黃帝經三卷經三卷經三卷寒熱病暴瘁內逆肝肺相搏血溢鼻口取天府穴天府乃手大陰也又足少陰腎之脉從腎上貫肝入肺中循喉嚨其病則飢不欲食面黑如地色發唾則有血夫氣者陽也血者陰也氣者响之血者濡之今血毒

行上出於鼻口者皆氣逆也故經言陽明厥逆怒則氣逆
暴瘧內逆者是也分之則各有所屬治之則各有所主如
傷寒家衄血者仲景言不可發汗蓋為脈微也若浮緊者
麻黃湯除緩者桂枝湯脈已微者二藥俱不可用宜黃芩
芍藥湯主之雜病謂見血者多責其熱也如衄血出於肺
以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地黃紫參丹參阿膠之類
主之咯唾血者出於腎以天門冬麥門冬貝母知母桔梗
百部黃蘗遠志熟地黃之類主之如有寒者乾薑肉桂之
類痰涎血者出於脾葛根黃耆黃連芍藥當歸甘草沉香
之類主之嘔吐血出於胃也實者犀角地黃湯主之虛者

小建中湯加黃連主之血證上行或唾或嘔或吐皆逆也
若變而下行於惡痢者順也血上行為逆其治難下行為
順其治易故仲景云畜血證下血者當自愈也與此意同
若無病之人忽然下痢其病進也今病血證上行而復下
行惡痢者其邪欲去是知吉也經云諸見血身熱脈大者
難治是火邪勝也身涼脈靜者易治是正氣復也故叔和
云鼻衄吐血沉細宜忽然浮大即傾危此之謂也
三黃補血湯治六脈俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃
年少陰心之脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎮治之劑大
瀉其氣以墜氣浮以耳辛溫微苦峻補其血

勝

熟地黄 二錢

當歸 一錢半

升麻 一錢

牡丹皮 一錢

黃耆 一錢

生地黄 三錢

柴胡 二錢半

白芍藥 半兩

川芎 三錢

右咬咀如麻豆大每服半兩水二大盞煎至一盞去

滓稍熱服食前補之太過以防血溢上竭

兩寸脉芤兩頭則有中間全無而虛曰芤血在上焦

或衄或嘔血以犀角地黄湯則愈

黃耆芍藥湯治衄血多歲面黃眼眵多眇手麻木

黃耆 三兩

升麻 一兩

羌活 半兩

炙甘草 二兩

葛根 半兩

芍藥 一兩

右件咬咀每服三錢水二盞煎至一盞去粗溫服之

十五服而愈

六脉細弦而漻按之空虛其色必白而夫不沃者脫

血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱滯潤

之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

人參飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參 去芦三分

黃耆 一錢

五味子 五箇

白芍藥 一錢

甘草 一錢

當歸身 三分

麥門冬 二分

右件為藥散分作二服每服水一盞八分並至一盞去滓稍熱服

一貧者有前證以前藥投之愈繼而時在冬天居大室中卧大熱坑而吐血數次再來求治料以病久虛弱附脾有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉其裏之虛熱是其法也冬天居大室衣蓋單薄是重虛其陽表有大寒墮過裏熱火邪不

得舒伸故血出於口仲景傷寒論中一證太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不愈遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同遂用麻黃桂枝湯

麻黃 一錢 去其外寒

黃耆 一錢 實表益衛

桂枝 半錢 補表虛

白芍藥 一錢 益脾

甘草 一錢 補其脾胃之虛

人參 二分 益上焦氣而實表

麥門冬 三分 保肺氣

五味子 五箇 安肺氣

當歸身 半錢 活血養血

右件都作一服水二盞先煮麻黃令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去滓稍熱臨睡一服而愈更不

再作

人參救肺散治咳血吐血

升麻 一錢

當歸尾 二錢

白芍藥 一錢

黃耆 二錢

甘草 半錢

陳皮 半錢

柴胡 一錢

熟地黄 二錢

蘇木 半錢

人參 二錢

蒼朮 一錢

右件都作一服水二盞煎至一盞去粗溫服食前
麥門冬飲子治吐血久不愈

五味子 十箇

當歸身

黃耆 一錢

麥門冬 去心半錢

人參 各半錢

生地黄 五分

右件為麤末都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熟
服不拘時以三稜鍼於氣衝出血立愈
鼻衄不止或素有熱而暴作諸藥無驗
以白紙一張作八牒或十牒於極冷水內濕紙置頂
中熱熨斗熨至一重或二重紙乾立止

○消渴門

消渴論

陰陽別論云二陽結謂之消脉要精微論云瘵成爲消中
二陽者陽明也午陽明大腸主津病消則目黃口乾是津
不足也足陽明胃主血熱則消穀善飢血中伏火乃血不
足也結者津液不足結而不潤皆燥熱爲病也此因穀食
甘美而多肥故其氣上溢轉爲消渴治之以菊除陳氣也
不可服膏梁芳草石菜其氣慄悍能助燥熱也越人云邪
在六府則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉
盛矣陽脉大盛則陰氣不得營也故皮膚肌肉消削是也
經云凡治消瘵什繫編枯痿厥氣滿癸逆肥貴人則膏梁
之疾也岐伯曰脉實病久可治脉弦小病久不可治後分

繫當擊子

渴

引

爲三消高消者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於
肺傳於膈消者是也以白虎加人參湯治之中消者善食
而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾飲水多食飢虛瘵
成消中者是也以調胃承氣三黃丸治之下消者煩燥別
飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以
六味地黃丸治之總錄取謂未傳能食者必癸腦疽背瘡
不能食者必得中滿鼓脹皆謂不治之證潔古老人分而
治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏方
白朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣前人用
茶決有石哉或白朮傳瘡疽者何也坎火邪勝也其瘡痛

音曰

甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急
攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死未
傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更其
道也然臟府有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜
制大其服皆適其至所為故如過與不及皆誅罰無過之
地也如高消中消制之太急速過病所久而成中滿之病
正謂止熱未除中寒復生者也非蒸之罪失其緩急之制
也處方之制宜加意焉
生津甘露飲子治高消大渴飲水無度舌上赤澁上下齒
皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹痛渾身色黃目白睛

黃甚則四肢痿弱無力面壅脫色脇下急痛善噦善怒健
忘醫腰背寒兩丸冷甚

石膏一錢二分

人參二錢

生甘草一錢

炙甘草二錢

山梔子一錢

華澄茄一錢

白豆蔻一錢

白葵五分

黃蘗酒拌元一錢半

香白芷一錢

連翹一錢

杏仁去皮一錢半

麥門冬五分

黃連三分

木香三分

桔梗三錢

半錢

半錢

半錢

半錢

升麻 二錢

姜黃 一錢

知母 二錢 酒製

當歸 身 四分

全蝎 二箇

藿香 二分

柴胡 三分

藿香 五分

消之為病燥熱之氣勝也內經曰熱淫所勝佐以
甘苦以甘瀉之熱則傷氣之傷則無潤折熱補氣
非甘寒之氣不能除故以石膏甘草之甘寒為主
啓玄子云滋水之源以鎮陽光故以黃連黃蘗
子知母之苦寒瀉熱補水為臣以當歸杏仁麥門
冬全蝎連翹白芷為葵藿香耳中寒和血潤燥為

白甘

佐以升麻柴胡苦平行陽明少陽二經白豆蔻末
香薷香反佐以取之又為因用桔梗為舟楫使浮
而不下也

煎

右件為細末如法湯浸蒸餅和勻成劑捻作餅子
半乾秤碎篩如黃米大食後每服二錢抄於掌中以
舌舐之隨津唾下或送以白湯少許亦可此制之緩
也不惟不成中滿亦不傳下消矣戊申正月七日葉
律千戶服此大效

藿香飲子治渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小
便頻數

先

石膏 三錢

酒知母 一錢半

生耳草 一錢

炙甘草 半錢

人參 半錢

防風 一錢

半芩 二分 湯浸

蘭香 半錢

白芷 一錢

連翹

桔梗

升麻 各半錢

右同為細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作薄片子日中

照半乾碎如米每服二錢食後淡生薑湯送下

地黃飲子治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液

長肌肉

杏仁 六箇

生甘草 三分

石膏 一錢

黃連 酒製八分

桃仁 六箇

生地黄 酒製七分

黃蘗 酒製一錢

當歸 酒製四分

柴胡 三分

炙甘草 三分

升麻 一錢

紅花 少許

知母 酒製五分

麻黃根 三分

漢防己 酒製五分

羌活 五分

半錢

溫

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

濕服食後忌濕麵房事鹽血戊申仲冬張安撫服此

大効

當飯潤燥湯治消渴舌上白乾燥唇乾口乾眼淚黑處
見浮雲大便閉澀乾燥結硬喜濕飲陰頭短縮

升麻 一錢半

柴胡 七分

耳草 六分半生半

細辛 一分

黃蘗 一錢

知母 一錢

石膏 一錢

杏仁 六箇

桃仁泥子 一錢

麻仁泥子 一錢

當飯身 一錢

紅花 少許

防風 一錢

荆艾穗 一錢

熟地黄 三分

小椒 三箇

右件咬咀都作一服水二椀煎至一盞去粗食後溫
服忌辛熱物

清涼飲子治消中能食而瘦口乾舌乾自汗大便結燥
小便頻數

羌活 一錢

柴胡 一錢

升麻 四分

防風 五分

當飯身 六分

生甘草 半錢

炙耳草 一錢

石膏 一錢半

酒知母 一錢

漢防己 半錢

草龍膽 酒製 一錢半

紅花 少許

杏仁 十箇

黃耆 一錢

黃蘗 一錢半

桃仁 五箇

生地黄 酒製 半錢

黃芩 酒製 一錢

右件咬咀麻豆大都作一服水二盞酒一匙煎至一盞去相稍熱服食後

清神補氣湯前消渴證皆愈止有口乾腹不能嚮起

升麻 一錢半

柴胡 七方

生甘草 五分

黃蘗 酒製 半錢

黃連 酒製 半錢

知母 酒製 半錢

石膏 四分

杏仁 六箇

桃仁 一錢

當歸身 一錢

紅花 少許

防風 一錢

荆芥穗 一錢

熟地黄 三分

小椒 二箇

細辛 一分

生地黄 一分

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去相稍熱食後服

甘草石膏湯消病全愈再添舌白滑微腫咽喉嚙唾覺痛嗌腫時有渴白沫如膠飲冷則稍緩

升麻 一錢半
 甘草 五分
 知母 一錢
 杏仁 六箇
 當歸身 一錢
 小椒 二箇
 黃連 三分
 防風 一錢
 生地黄 一分
 柴胡 七分
 黃蘗 一錢
 石膏 六分
 桃仁 一錢
 熟地黄 三分
 細辛 一分
 紅花 少許
 荆芥穗 一錢
 右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

稍熱食後服

○辨六經渴并治

太陽渴脉浮無汗者五苓散滑石之類 陽明渴脉長者
 汗者白虎湯涼膈散之類 少陽渴脉弦而嘔者小柴胡
 加瓜蒂湯主之 太陰渴脉細不欲飲縱飲思湯不思水
 ○少陰渴脉沉自利者猪苓湯三黃湯之類 厥陰渴脉
 微引飲者小小與之滑石治渴本為竅不利而用之以其
 燥而能亡津液也天令濕氣大過者當用之 無濕用之是為犯禁
 假令小便不利或渴或不渴知內有濕也小便自利而渴
 知內有燥也濕宜滲泄之燥以潤之則可矣雜證汗而渴

四君子理中湯之類

少少室

以室元

○熱

高室鑑作不渴字

者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之傷寒食少而渴當以
衍和胃之某止之不可用涼某止之恐復損胃氣愈不能
食也白朮茯苓是也太陽無汗而渴不宜白朮湯若汗後
脈洪大而渴者宜與之陽明有汗而渴不宜五苓散若小
便不利汗少脈浮而渴者宜與之病者心肺氣而不渴者
知不在太陽少陰之本而只在標也在標則高矣渴者是
在本也

○瘡瘍門

明瘡瘍之本末

生氣通天論云營氣不從逆戾肉理乃生癰腫又云膏粱

之憂足生大丁受如持虛陰陽應象論云地之濕氣感則
害人皮肉筋脉是言濕氣外傷則營氣不行榮衛者皆營
氣之取經營也營氣者胃氣也運氣也榮氣為本本逆不
行為濕氣取壞而為瘡瘍也膏粱之憂亦是言厚滋味過
度而使營氣逆行凝於經絡為瘡瘍也此邪不在表亦不
在裏惟在其經中道病也已上內經取說俱言因營氣逆
而作也遍看諸瘡瘍論中多言二熱相搏熱化為膿者有
只言熱化為膿者又言濕氣生瘡寒化為熱而為膿者此
皆瘡疽之源也宜於取見部分用引經某并兼見證某中
分陰證陽證先寫營氣是其本本逆助火濕熱相合敗壞

壞

肌肉而為膿血者此治次也宜遠取諸物以比之一歲之中大熱無過四五月之間當是時諸物皆不壞爛壞爛者六七月之間濕令大行之際也近取諸身熱病在身止顯熱而不敗壞肌肉此理明矣標本不得邪氣不服言一而知百者可以為上工矣

營氣不從逆於肉理乃生瘡癰且營氣者胃氣也飲食入於胃先輸於脾而朝於肺肺朝百脉次及皮毛先行陽道下歸五臟六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節以飲食肥醲之類雜以厚味日久大過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走空竅先行陽道反行陰道逆於肉理則

令能字恐錯

爛

濕氣大勝則子令能母實火乃大旺熱濕既盛必乘尅腎若雜以不順又損其真水腎既受邪積久水乏則從濕熱之化而上行其瘡多出背出腦坎為大丁之最重者也若毒氣行於肺或脾胃之部分毒之次也若出於他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏梁之變足生大丁受如持虛如持虛器以受物物無不受治大丁之法必當寫其營氣以標本言之先受病為本非苦寒之劑為主為君不能除其苦足疼痛也諸瘡瘍有痛往々多以乳香沒藥雜以芳香之藥止之必無少減之理若使絡流通勝腑中去其壅滯必無痛矣苦寒之劑除其疼痛

楚

營

凝

者反

茶下於咽則痛立已此神品茶也
 瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍者乃當氣而作也今反補之而
 自棄何異雖用茶施治而不能愈地之濕氣自外而入內
 者瘡瘍當先服茶而後用鍼如瘡瘍小不欲飲茶或嬰兒
 之瘡先當溫衣覆蓋令其凝泣塵滯血脉溫和則出血立
 已若不如此血脉凝滯便鍼則邪毒不瀉及傷良肉又益
 其瘡勢也瘡瘍及諸病而赤雖伏大熱禁不得攻裏為陽
 氣拂鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大
 便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥之藥以
 潤之如見風脈風證只可用發表風藥便可以通利得大

便行也若只乾燥秘澁尤宜潤之慎不可下也諸九竅不
 利者慎不可下也瘡瘍鬱冒俗呼昏迷是也宜汗之則愈
 驗瘡名色治之當從素問鍼經聖濟總錄易老瘡論及諸
 家治瘡用茶法度以為緊要臨病之際宜詳審焉

瘡瘍治驗

腦

白

戊申歲以飲酒太過脈候沉數九月十七日至真定腦之
 下項之上出小瘡不痛不痒謂是白瘡漫不加省是夜宿
 睡善甫家二日後覺微痛見國醫李公明之不之問凡三
 見之終不以為言又二日腦項麻木腫勢外散熱毒嫩發
 且聞此府劉帥者近以腦疽物故使疑之三日間痛大作

木

復

破

子

火

夜不後得寐二十三日請鎮之瘍醫遂處五香連翹明日
 再往又請同門一醫共視之云此疽也然而不可速療十
 八日得膿俟膿出用茶或於刺三月乃可平四月如故予
 記醫經凡瘡見膿九死一生果如二子言則當有束手待
 斃之悔矣乃詣姨兄韓參謀度俊家請明之診視明之見
 瘡談笑如平時且謂子言瘡固惡子當恃我無憂恐耳膏
 梁之變不當投五香五香已無及且疽已八日當先用大
 攻之策然後用茶午後以大艾炷如雨核許者攻之至百
 壯乃痛覺次為處方云是足太陽膀胱之經其病逆當反
 治脉中得弦緊搏之洪大而數又且有力必當伏其所主

令

而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可
 使氣和可使心已必先歲氣無伐天和以時言之可收不
 可汗經與病禁下法當結者散之鹹以奠之熱寒受邪而
 禁鹹諸苦寒為君為用甘寒為佐酒熱為因用為使以辛
 溫和血大辛以解結為臣三辛三甘益元氣而和血脉淡
 滲以導酒濕扶持秋冬以益氣瀉火以入本經之藥和血
 且為引用既以通經以為主用君以黃芩黃連黃蘗生地
 黃知母酒製之本經羌活獨活防風藁朮防己當歸連翹
 以解結黃耆人參甘草配諸苦寒者三之一多則滋營氣
 補土也生甘草瀉腎之火補下焦元氣人參槁皮以補胃

蘇必

氣未當飯尾去惡血生地黃當飯身補血酒製漢防已除
膀胱留熱沃酒助酒之濕熱凡此諸藥心得桔梗為舟楫
乃不下沉投劑之後疽當不痛不折精氣大旺飲啖進形
體健予如言服之藥後投床大斲日出乃寤以手捫瘡瘻
減七八予疑瘡透喉遽邀明之視之明之驚喜曰瘡平矣
屈指記日不五七日作痴子可出門矣如是三日忽有霄
寐之變予懼其為死候甚憂之而無可告語之者適明之
入門戲謂予曰子服藥後有三驗而不以相告何也乃歷
數云子三二日來徒嘆否乎曰然又問子脚膝奮弱今行
步有力否乎曰然又問子昨宵夢有霄寐之變何不自言

舊

欽四予

郭

予

技

平

手

予為之一笑終不以此變告之也二十九日瘡痛全失去
灸癥膿出尋作痴初鎮人見劉帥病疽之苦言及者皆為
悲慘聞予復病以瘡親舊相念者皆舉手加額以早安為
禱十月十七日明之邀往其家乘馬過市人見之有為之
失喜者蓋始於投劑至瘡痴歛都十日而已子往在聊
城見明之治梁縣楊飛御脇癰及郊文之父腦疽楊叔能
出疽不十數日皆平復然皆不若治子瘡之神也醫無不
難療腦脊瘡尤難世醫用花豈無取効者至於治效之外
乃能歷數體中不言之秘于生所見惟明之一人而已乙
未秋子自濟南迴傷冷太過氣絕欲死明之投劑應手而

子錢

愈起子之死并此為二矣他日效列斯立傳錢也當補述
之明年秋七月二十日五日河東元好問記

黃連消毒散

黃連 一錢

黃芩 五分

黃蘗 五分

生地黄 四分

知母 四分

羌活 一錢

獨活 四分

防風 四分

藁本 五分

當歸尾 四分

桔梗 五分

黃耆 二分

人參 三分

耳草 三分

連翹 四分

蘇木 二分

防己 五分

沢瀉 二分

橘皮 二分

右件剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞半去
粗溫服食後

癰

菱菱

一方加山梔子二分五味子二分麥門冬二分枳殼二
分猪苓二分各消毒潰堅湯治八發癰瘡癰癰癰癰癰
患人虛實藥劑輕重用之無不作效
丁未季春二十二日蒲葦主老年七十因寒濕地氣得
附骨癰於左腿外側足少陽膽經之分微侵足陽明分

闊六七寸長一尺堅硬漫腫不變肉色皮澤深但行
步作痛以指按至骨大痛與蒸一服立止再日堅硬而
腫消

內托黃耆酒煎湯

柴胡一錢半

肉桂一錢

黃耆二錢

黃蘗半錢

甘草炙半錢

連翹一錢

黍粘子炒一錢

當歸尾二錢

升麻七分

右件咬咀好糯米酒一盞半水一大盞半同煎至一

霍

癩

呂知

半

大盞去滓大溫服空心宿食消盡服之待少時以早
饍堅之使不令大熱上攻中上二焦也

尹老家寒已酉歲十月初有仲冬之寒形志皆苦於手陽
明大腸經分出癰芽四日稠膿幼小有癩沱其臂外皆腫
痛甚先腫在陽明左右寸皆短中得之俱弦按之洪緩有
力以癰得自八風之變以脈斷之邪氣在表其證大小便
如故飲食如常腹中和曰參味不在裏也不惡風寒止熱
燥脈不浮知不在表也表裏既和邪氣在經脈之中也故
云凝於經絡為瘡癰其癰出身乎已上故風從上受之故
知是八風之變為瘡止經脈之中也知其寒邪調和經中

使

血氣便無凝滯則已矣

白芷升麻湯

白芷 七分

升麻 半錢

甘草炙一分

黃芩 二錢 酒製

生黃芩 一錢半

黃耆 二錢

桔梗 半錢

紅花 少許

右咬咀作一服水酒各一大盞半同煎至一盞去滓
大溫服臨卧一服而愈

賈德茂男年十歲丁未四月十一日於左腿近膝腹內出
附骨癰不辨肉色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大其左脚乃肝

之髀上也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分
其脉左三部細而強按之洪緩微有力内托黃耆柴胡湯

黃耆 二錢

柴胡 一錢

羌活 半錢

連翹 一錢 三分

肉桂 三分

土瓜根 一錢 酒製

生地黄 一分

黃蘗 二分

當歸尾 七分半

右件咬咀作一服水三盞酒一盞同煎至一盞去滓
熱服宿食消盡服一服而愈

内托羌活湯治足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力

尻醫生癰堅硬腫痛大作

羌活 二錢

藁本 一錢

黃蘗 二錢 酒製

甘草 炙半錢

黃耆 一錢半

橘皮 半錢

防風 一錢

肉桂 三分

連翹

當歸尾 一錢

蒼朮 半錢

右件咬咀都作一服水二大盞酒一盞煎至一盞半
去滓熱服空心以來衣蓋覆其癰使某力行罷去衣
一服而愈

內托升麻湯治婦人面乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑
眼子其脉弦洪按之細小

升麻 一錢半

連翹 一錢半

黃耆 一錢

黍粘子 半錢

甘草 炙一錢

葛根 一錢半

肉桂 三分

當歸身 一錢

黃蘗 一分

右件咬咀都作一服水二盞酒半盞同煎至一盞去

滓食後溫服

救苦化堅湯治癰癰馬刀挾癰從耳下或耳後下頸至

看上或入缺盆中乃手足少陽之經分其癰瘰在肘類
下或至缺車乃足陽明之分受心脾之邪而作也合將
二證合而治之

升麻一錢

葛根半錢

真漏蘆

此三味俱足陽明本經藥也

連翹一錢

此一味十二經瘡藥中不可無乃結

者散之能散諸血結氣聚此瘡之神藥也其

辛溫涼之氣味中聖藥也

牡丹皮

三分 出腸胃

當歸身

三分

歸

間

熟地黃

三分

此三味諸經和血生血涼血藥也

黃耆一錢

護皮毛開腠理虛及活血脈生血亦

瘡家聖藥又能補表之元氣消安而弱也

白芍藥

三分

如夏月倍之其味酸其氣寒能補

中益肺氣之氣弱治腹中痛必用之如冬寒

證不可用之為寒氣故也又治腹中不和此

乃散而不收故用芍藥味酸以收散氣

肉桂

二分 大辛熱

能散結積陰瘡瘍須當少用

之以寒因熱用又為寒氣覆其瘡以大辛熱

浮凍 頰

馬須

以消淨味之氣如有燥或煨者去之陰證瘡
必須用之

柴胡

八分同前說
連翹同用

黍粘子

無腫不用黍粘子若無力挾瘰瘡是不在少

陽經也去柴胡

羌活一錢

獨活半錢

防風半錢以三味必關手足太陽證脊痛項強

不可回顧腰似折項似拔者用其防風一味

辛溫若瘡在膈已上雖無手足太陽經證亦

當用之為能散結去上部風病人身拘急者

能

風也諸痛見此證亦須用

昆布二分 其味大鹹若瘡堅硬者所宜用為鹹

軟堅

廣茂三分 煨 若瘡堅硬甚者用不甚堅硬勿用

之

荆三稜二分 元 煨 為堅者削之

人參三分 補肺氣之藥也如氣短氣不調及喘

者可加之

益智仁二分 如唾多者胃不和也或病人吐沫

吐食胃上寒者加之

厚朴姜製一錢二分 如腹時見脹者加用之

麥蘖麵一錢 治腹中縮急兼能消食補胃

麴末炒黃二分 為食不能消化

甘草炙半錢或二分 能調中和諸藥瀉火益胃

其分而不定者亦能助瘡邪為脾胃疾宜瀉

營氣

黃連去須二分 以治煩悶

黃蘗炒三分 如有熱或腿脚無力者加之如有

燥煩欲去衣者腎中伏火也更宜加

右件同為細末湯浸蒸餅和捻作餅子日乾搗如米

粒每服秤二錢或三錢白湯送下量病人虛實臨時

斟酌無令茶多妨其飲食此治之大法也

如止在陽明分為瘰癧者去柴胡黍粘子二味餘皆用

之如以下提別在少陽分為馬刀核癭者去獨活漏蘆升麻葛

根更加瞿麥穗三分 若氣不順加橘皮甚者加木香

少許

若本人素氣弱見患之病其病勢來時氣盛時不短促

者不可考其平素宜作氣盛而從病變之權也更宜

加黃芩黃連黃蘗知母防己之類視邪氣在上中下

三焦○假令在於上焦加黃芩一牛晒製一半生用

半

在中焦者加黃連 一半酒製一半生 用在下焦則加
酒製知母酒製黃蘗酒製防己之類選用之

若病人不大便為大便不通而滋其邪盛也急加酒製
大黃以利之如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製大

黃二味

如風結燥不行者加麻子仁大黃

如風澀而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之

如脈澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以

除氣燥也

如陰寒之病為寒結閉而不大便以局方中半硫丸或

加並附子乾薑冰冷與之 大抵用茶之法不惟瘡

瘍一說諸疾病量人素氣弱者當去苦寒之茶多加

人參黃耆甘草之類瀉火而先補元氣餘皆倣此

散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬塊子堅如石者在耳下至

缺盆中或至肩上或入脇下皆足少陽經中及瘰癧遍

於頰或至頰車堅硬如石在足陽明經中取出或二證

瘡已破流膿水並皆治之

柴胡 四錢

升麻 三分

草龍膽 半兩 酒製

黃芩 八錢 酒製 一半

炙甘草 二錢

桔梗 半兩

連翹 三錢

當歸尾 二錢

黃蘗 酒製去皮 半兩

葛根 二錢

京三稜 三錢 酒製 微炒

昆布 去土半兩

瓜蒌根 半兩 酒製 切碎

白芍藥 二錢

酒知母 先剉 酒製 半兩

黃連 一錢

廣茂 三錢 剉碎 酒製 微炒

右件吐咀每服秤六錢或七錢水二盞八分先浸多
半日煎至一盞去粗熱服於卧處身脚在高處頭低
垂每噲一口作十次嚥服畢依常安卧取茶在臍上
停畜故也另攢半料作極細末煉蜜為丸如菜豆大

塊硬

每服一百丸或百五十九用此湯一口送下食後服
之茶多少量病人虛實應服茶皆效此例
升麻調經湯治頰下或至頰癩癰以證出足陽明胃之
經中來也若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎中來也乃
戊傳癸腎是夫胃傳毒俱作塊子堅頑大小不等並皆
治之或作丸服亦得

升麻 八錢

草龍膽 酒製炒 半兩

當歸尾 三錢

連翹 半兩

葛根 五錢

黃芩 剉去皮 酒製 半兩

桔梗 半兩

芍藥 三錢

常

黃蘗 去皮 酒炒 二錢
 知母 酒炒 一兩
 黃連 去須 五錢
 廣茂 酒炒 五錢
 京三稜 五錢 碎切
 炙甘草 半兩
 生黃芩 四錢
 右件另秤一半作末蜜為丸如棗豆大每服百丸或
 一百五十九一半多作呷咀每服秤半兩若能食便
 硬可旋加之至七八錢止水二盞先浸多半日煎至
 一盞去粗臨卧熱服脚高頭下而卧嚙一口作十次
 嚙留一口在後送下九子茶服茶畢卧如當此制之
 緩也

少

連翹散 堅湯治耳下至缺盆或至肩上生瘡堅硬如石
 動之無根名曰馬刀從午足以陽經中來也或生兩脇
 或已流膿作瘡未破皆治之

柴胡 一兩 二錢
 連翹 半兩
 芍藥 三錢
 炙甘草 三錢
 當歸尾 半兩 酒製
 芍藥 三錢
 土瓜根 一兩 酒炒
 炙甘草 三錢
 草龍膽 酒製 四錢
 生黃芩 半兩
 蒼朮 二錢
 黃芩 酒炒 二錢 七錢
 黃連 二錢 酒炒
 廣茂 半兩
 京三稜 細判 半兩 同廣茂
 酒製 一次 微炒 乾

半

右件另秤一半煉蜜為丸如菘豆大每服一百丸或
百五十九各秤和勻每服半兩冰一盞八分浸多每
日煎至一盞去粗卧時熱服頭下脚高去枕而卧每
口作十次嚥留一口送下丸子茶服畢卧如常亦緩
治之

項上癰癰馬刀將先出一瘡用四稜鐵環按定不令走
移作口子以油菜紙摵任之勿令合了以絕其瘡之源
其效至速如瘡不破或本不肯破更以龍泉散塗

龍泉散方

龍泉粉 各半兩妙半潤濕
另研

昆布 或去土三錢

廣茂

京三稜 各半兩酒
製判碎炒

右件同為細末煎熱水調塗之用此去疾尤速一二
日一易之

柴胡連翹湯治男子婦人馬刀瘡

柴胡 半兩

黍粘子 二錢

中桂 三分

連翹 五錢

瞿麥穗 六錢

甘草 炙三錢

生地黃 三錢

當歸 尾一錢半

黃蘗 三錢酒製

知母 半兩酒製

炒黃芩半兩

右件咬咀如麻豆大每服秤五錢或三錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服食後時服之

黍粘子湯治耳痛生瘡

桔梗七兩

柴胡三分

連翹二分

黍粘子二分

當歸尾二分

黃芩二分

生地黄二分

黃耆三分

炙甘草二分

黃連二分

草龍膽一分

昆布一分

半

一

蒲黃一分

蘇木三分

桃仁三箇

紅花少許

生甘草一分

右件咬咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服食後忌寒藥利大便

連翹防風湯治皮痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

麻黃一錢

桂枝二分

草豆蔻仁一錢

當歸尾七分

紅花少許

羌活一錢

防風一錢

柴胡一錢

升麻 半錢

桔梗 半錢

生地黃 半錢

蒼朮 一錢

連翹 半錢

甘草 半錢

酒黃芩 二錢

右件判如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去

滓稍熱服之

消腫湯治馬刀瘡

柴胡 二錢

當歸尾 一錢

甘草 一錢

連翹 三錢

紅花 少許

生黃芩 二錢

黃連 半錢

黍粘子 半錢 炒

瓜蒌根 一錢半

黃耆 一錢半

右件每服秤半兩水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食後忌酒濕麵

柴胡通經湯治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀

柴胡 二分

當歸尾 二分

黃連 五分

生甘草 二分

桔梗 二分

連翹 二分

紅花 少許

黃芩 二分

黍粘子 二分

京三稜 二分

苦

右件咬咀麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食後忌營菜泄大便

保生救苦散治火燒熱油所損或至脫肌肉及一切尖咬傷損并刀斧取傷及諸瘡血不止如神上以茶時瘡口變黑色勿恠待茶力盡却變紅和也

生寒水石 不以多少

盡

右為細末小油調塗之若乾上亦得其痛立止與無瘡同不作膿無分毫苦楚日近完復永無破傷風證

○聖愈湯治諸瘡血出多而心煩不安不得眠睡此七血故也

錢

熟地黄 三分

生地黄 三分

當歸身 半兩

川芎 三分

黃耆 半錢

人參 三分

右件咬咀都作一服水一大盞半煎至一盞去滓稍熱服不計時候

一上散治諸般痲癩必效

雄黃 通明手可碎五錢

熟硫黃 半兩

斑猫 三箇去翅足研碎

黑狗脊 五錢

寒水石 五錢

蛇床子 半兩炒

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入斑猫和勻蛇床

六

子黑狗脊另為細末同研勻先煎癬令湯透去茄油調手中擦熱鼻中嗅三兩次擦上可一上即愈也如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡孔中有虫加雄黃如喜火灸湯燙者加硫黃即嗅不止亦可愈也

柳枝當飯膏貼一切熱瘡

當飯尾

去細稍水浸

杏仁 浸去皮尖

黃丹

細研水飛

肥嫩柳枝 三兩半切如一

肥嫩桃枝

一兩半洗淨令乾

芝麻油 一升

右件先令油熱下桃柳枝熬令半焦以綿裹當飯杏

仁同煖至桃柳枝黑焦為度去藥粗瀝油澄淨抹去銚子中淨穢令淨再上火令沸旋々入黃丹熬滴水不不散為度或只於紙上攤令不透紙為度桃枝當飯膏貼一切惡瘡

當飯身

去細稍洗去

杏仁 湯浸去皮

肥嫩柳枝

三兩半洗乾

肥嫩桃枝

一兩半切寸許水洗乾

黃丹

水飛六兩

芝麻油 一升

右件先令油熱下桃枝柳枝熬令半焦以綿裹當飯杏仁同熬至桃枝柳枝黑焦為度去藥滓瀝油澄淨

抹出鈔子中滓穢令淨再上火令沸旋々入黃丹熬成滴水不散為度或只攤紙上不透為度

奪命膏專治丁瘡石癰始終皆大寒證

- 當歸尾 一兩
- 木鱉子 去皮五箇
- 巴豆 去殼肥者 二十枚
- 桃枝 寸許一百一十莖
- 沒藥 三錢
- 黃丹 五兩
- 早麻子 去殼 二十箇
- 粉霜 半兩
- 白芨 三錢半
- 乳香 三錢
- 藁本 半兩
- 杏仁 七十箇
- 柳枝 寸許六十莖
- 芝麻油 一斤

右件一處先將桃柳枝下在油內煮焦取出不用次下其餘藥物熬至焦黑液去滓却將油澄清上火令沸旋々入黃丹熬成膏藥緋絹上攤之立有神效如寒證去其瘡不任此藥作痛換柳枝膏貼大抵膏藥止可衛護皮膚行瘡口上氣血而已使氣血周流而無凝滯乃止法也既經絡行必無疼痛易為痊瘳矣

訣 治瘡脉法

身重脉緩濕勝除濕 身熱脉大 心燥時腫乍來乍去 太熱諸痛眩運動搖脉眩太風 氣澁氣滯乾燥亡津液 脉澁瀉氣補血 寒勝則浮食不入使溺多惡寒脉緊細

瀉寒水

破毒散治癩毒橫痃已成未成隨即消散應效如神

滑石末 三錢

斑毛 煨去頭足翅
三箇為末

右二件和勻分作三服空心食前一日服畢少用茶
湯調下毒氣俱從小便中出如小便疼痛濃煎車前
子木通澄心澤瀉湯頓服即已

東垣試效方卷第三

