



| | | | | |
|-----|-----|---|---|-----|
| 漢書門 | | | | |
| 類 | 號 | 函 | 架 | 冊 |
| 1 | 010 | 0 | 二 | 110 |

| | |
|------|-----|
| 内閣文庫 | |
| 漢書 | 函架 |
| 110 | 110 |

| | |
|------|------------|
| 内閣文庫 | |
| 番號 | 漢 13010 |
| 冊數 | 120 (41) |
| 函號 | 301 64 |

瘍科證

治準繩卷之四

金壇王肯堂輯

門人新安閔承詔校

脇部

○脇疽

靈樞云發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之

其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆治之剉

藜草根各一升以水一斗六升煮之竭為取三升即

強飲厚衣坐於釜上令汗至足已疵疾蝨切 甲乙經於赤小豆下作

治之剉藜草赤 松根各一升鬼遺云俠熒疽腫起發肋及兩肩

肘頭二十日不穴死九日可刺發赤白相間膿多可

脇部

小十四

治全無赤白者不治。又云兩肋起疽名爲發肋初腫盛至十數日不穴攻卽腫大如杯椀高如鍬背痛徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患應左邊痛唯有此處多是內毒却入攻而死者多人有斯患急以針刺出膿血則免內攻傷內矣。或問脇上生疽何如曰是名脇疽屬手厥陰心包絡足厥陰肝火熱毒怒氣相併而作活命飲加柴胡紫金丹烏金散選用壯實者八陣散一粒金丹下之此證宜速治不然潰爛不斂多致危困一人患此如胡桃微痛微腫月餘漸大如杯醫作痰治或作肝積或云痞塊竟莫能效。

數月遂大如益堅硬如石不甚疼痛微紅漫腫復得暴怒胸腹脹滿小水不利脉遲而微投以化氣丸六一散小便利胸次寬繼投烏金散奪命丹間服八陣散月餘漸消。

一人年踰五十腋下患毒瘡口不合右關脉數而渴此胃火也用竹葉黃耆湯而止再用補氣藥而愈嘗治午後發渴或發熱用地骨皮散効。一人性急味厚常服燥熱之藥左脇一點痛輕診弦重扪知其痛處有膿與四物加桔梗香附生薑煎十餘貼痛處微腫如指大針之少時屈身膿出與四物調理而安。

一夫人左脇內作痛牽引胸前此肝氣不和尚未成
瘡用小柴胡加青皮枳殼四劑少可加芎歸治之愈
一人連年病瘡後生子三月病熱右脇下陽明少
陽之分生一癰甫平左脇下相對又一癰膿血淋漓
幾死醫以四物湯敗毒散數倍人參以香附為佐犀
角為使大料飲乳母兩月而愈踰三月忽腹脹生赤
瘳如霞片取剪刀草汁調原蠶沙傳隨消又半月移
脹入囊為腫黃瑩裂開兩丸顯露水出以紫蘇葉盛
麩炭末托之旬餘而合此胎毒證也 一婦因忿鬱
腋下結一核二十餘年因怒加腫痛完穀不化飲食

少思此腸胃虛也以六君子加砂仁肉桂乾薑肉豆
蔻泄雖止而膿清瘡口不合用十全大補湯月餘而
愈機按前項二條脇瘡一因其性多躁急故用四物
柴胡疎理之劑以安靜之因其肝氣不平故用小
其性情為治不特專于攻毒也張通北人年踰
四十夏月腋下患毒潰後不斂膿出清稀皮寒脉弱
腸鳴切痛大便溏泄食下即嘔此寒變而肉陷也宜
大辛溫之劑遂以托裏溫中湯二貼諸證悉退更以
六君子加炮乾薑肉桂數劑再以十全大補湯而愈
固一人脇腫一塊日久不潰按之微痛脉微而澹此
形證俱虛也經曰形氣不足病氣不足當補不當瀉

宜用人參養榮湯彼不信乃服流氣飲虛證悉至方服前湯月餘少愈但腫尚硬以艾葉炒熱熨患處至十餘日膿成以火針刺之更灸豆豉餅又服十全大補湯百貼而愈 蓋流氣飲通行十二經諸經皆為所損况膽經之血本少又從而損之寧不傷生東垣曰凡一經受病止當求責其一經不可干擾餘經苟泛投尅伐之劑則諸經被戕寧無危乎 一人年五十素飢寒患右肋腫如覆瓢轉側作水聲脉數經曰陰虛陽氣湊襲寒化為熱熱甚則肉腐為膿即此證也及按其腫處即起是膿成遂濃煎黃芪六一湯令

先飲二鍾然後針之膿出數碗虛證並至遂用大補三月餘而愈 大抵膿血大泄血氣俱虛當峻補之雖有他病皆宜緩治蓋元氣一復諸病自退老弱之人不問腫潰尤當補也 一人因勞發熱脇下腫痛脉雖大按之無力此氣血虛腠理不密邪氣襲于肉理而然也當補之以接虛怯之氣以補中益氣湯加羌活四劑少可去羌活又百餘劑而愈 一人面白神勞脇下生一紅腫如桃教用補劑不信乃用流氣飲十宣散血氣俱憊而死 一人年踰二十腋下患毒十餘日腫硬不潰脉弱時嘔予謂腫硬不潰陽氣

虛嘔吐少食胃氣弱宜六君子湯加砂仁藿香彼謂
 腫瘍時嘔毒氣攻心潰瘍時嘔陰虛宜補予曰此丹
 溪大槩言也若腫赤痛甚煩躁肌實而嘔為有餘當
 作毒氣攻心而下之以瘡屬心火故也腫硬不潰脈
 弱時嘔為不足當補之亦有痛傷胃氣或感寒邪穢
 氣而嘔者雖腫瘍尤當助胃壯氣蓋腫瘍毒氣內侵
 作嘔十有一潰瘍濕氣內傷作嘔十有八九彼不
 信飲攻伐藥愈甚復請診脈微弱而發熱予謂熱而
 脈靜及脫血脉實汗後脈躁皆難治果歿

○內發丹毒

或問脇下至腰勝間腫痛赤色如霞何如曰此名內
 發丹毒治之稍緩毒攻於內嘔噦昏迷胃腹臌脹者
 死二便不通遍身青紫者死急破出惡血服防風通
 聖散去白朮甘草紫金丹勝金丹汗之服汗劑得汗
 則生無汗則死嘔吐不食譫語者死

八腹部十一

○臍上疽

或問臍上寸許發疽何如曰此名衝疽又名中發疽
一名壅腎瘡由心火熾盛流入腎經所致腫高膿稠
色赤可治宜流氣飲活命飲勝金丹奪命丹選用若
平塌黑色膨脹惡心膿水清稀肉腎疼痛渴甚瀉利
無度譫語直視者死潰久不斂者死 按後所言危
證只是虛耳如能大補不死也

○臍癰

或問當臍生癰何如曰此即臍癰也由心經積熱流

於大小腸二經所致宜何首烏散活命飲加升麻及
紫金丹三生散選用壯實者一粒金丹下之
為神闕穴禁針之所早消散之免使見膿為上
按臍

○小腹痛

鬼遺云衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日帽帽五日
變色可刺不刺及導引出膿毒不治五十餘日死
或問臍下發疽何如曰此即小腹癰臍下一寸五分為
氣海二寸為丹田三寸為關元皆屬任脉由七情不和
所致急服活命飲紫金丹奪命丹壯實者一粒金丹八
陣散下之老弱者黃芪木香散內補十宣散十全大補

湯選用若潰而低陷膿水清稀或潰爛久不斂者死
或問一人年十九患疽於小腹之左數月堅塊如石
寒熱間作飲食減少漸至羸廵何如曰是名緩疽屬
足太陰經積熱所致由醫不得法邪正相持耳投以
紫金丹活命飲間服十全大補湯半月而愈

○總論

疔腹癰謂瘡生於肚腹或生於皮裏膜外屬膏梁厚
味七情鬱火若漫腫堅硬肉色不變或脉遲緊未成
膿也四君加芎歸白芷枳殼或托裏散腫軟色赤或
脉洪數已成膿也托裏消毒散膿成而不外潰者氣

血虛也。卧針而刺之。腫焮作痛者。邪氣實也。先用仙方活命飲。隔蒜灸。以殺其毒。後用托裏以補其氣。若初起。欲其內消。當助胃壯氣。使根本堅固。而以行經活血之藥佐之。若用剋伐之劑。欲其消散。則腫者不能潰。潰者不能斂。若用疎利之藥。下其膿。則少壯者多為難治。老弱者立見危亡。

一人年踰三十。腹患癰腫。脈數喜冷。齊氏曰。瘡瘍腫起。堅硬者實也。河間曰。腫硬。督悶煩躁。飲冷邪在內也。用清涼飲。倍大黃二劑。稍緩。次以四物湯。加苓連山梔木通四劑。而潰。更以十宣散去。參耆桂加金銀

花天花粉。彼欲速効。自服溫補藥。肚腹遂腫。小便不利。仍用清涼飲。膿潰。數梔。再以托裏藥治之。而愈。一人腹癰。焮痛煩躁。作嘔。脈實。河間曰。瘡瘍火屬。須分內外。以治其本。又云。嘔噦心煩。腫硬。督悶。或皮肉不變。脈沉而實。毒在內也。當疎其內。以絕其源。用肉疎黃連湯。利二三次。行諸證悉退。更以連翹消毒散而愈。一人腹癰。膿熟。開遲。脈微細。膿出後。瘡口微膿。如蟹吐沫。此內潰透膜也。瘡瘍透膜。十無一生。雖用大補。亦不能救。此可為待膿自出之戒也。一人素嗜酒色。小腹患毒。脈弱微痛。欲求肉消。予謂當助胃。

壯氣兼行經活血佐之可消彼欲速効自用敗毒等藥勢果盛瘡不潰膿飲食少思兩月餘復請診脉愈弱盜汗不止聚腫不潰肌寒肉冷自汗色脫此氣血俱虛故不能發腫成膿以十全大補湯三十餘劑膿成針之反加煩躁脉大此亡陽也以聖愈湯二劑仍以前湯百劑而愈 司馬李梧山患此腹痛而勢已成用活命飲一劑痛頓止用托裏消毒散腫頓起此膿將成也用托裏散補之自潰而愈 錦衣掌堂劉廷器正德辛未仲夏腹患癰潰而膿清熱渴腹脹作嘔不食或以爲熱毒內攻皆用芩連大黃之劑病愈

甚薛曰當捨時從證投以參芪薑附等藥一劑嘔止食進再用托裏等劑而瘡愈 進士邊雲莊腹痛惡寒脉浮數薛曰浮數之脉而反惡寒瘡疽之證也不信數日後復請視之左尺洪數薛曰內有膿矣仍不信至小腹痛脹連及兩臂始悟薛曰膿潰臂矣氣血俱虛何以收斂急服活命飲一鍾臂潰一孔出膿斗許氣息奄奄用大補藥一劑神思方醒每去後糞從瘡出痛不可當小腹間如有物上挺卽發瘻不省人事煩躁脉大舉按皆實省而診之脉洪大按之如無以十全大補倍用參芪至四斤更加附子二枚煎膏

服而瘕止又用十全大補湯五十餘劑而瘕斂上
舍周一元腹患癰三月不愈膿水清稀朝寒暮熱服
四物黃蘗知母之類食少作瀉痰涎上湧服二陳枳
實之類痰涎愈甚胸膈痞悶謂薛曰何也薛曰朝寒
暮熱血氣虛也食少作瀉脾腎虛也痰涌胸痞脾肺
虛也悉因真氣虛而邪氣實也當先壯其胃氣使諸
臟有所稟而邪自退矣遂用六君加黃芪當歸數劑
諸證漸退又用十全大補湯肌肉漸斂更用補中益
氣湯調理而痊 上舍毛體仁素陰虛春初咳嗽胸
中隱痛腎脈數而無力肺脈數而時見此腎氣虧損

陰火熾盛用六味丸料一劑服之病勢雖減內癰已
成蓋因元氣虛而未能發出火令可畏不信服痰火
之劑兩月後乳間微腫脈洪數而無力薛曰膿內潰
矣當刺出其膿以免內攻之禍不信又月餘請視但
針得一孔膿攙不利仍復內攻唇舌青赤薛曰臟腑
已壞吾何能治之後果歿 從姪孫年十四而畢姻
乙巳春年二十四腹中作痛用大黃等藥二劑下血
甚多胸腹脹滿痰喘發熱又服破氣降火藥一劑汗
出如水手足如冰薛往他適歸診之左關洪數右尺
尤甚乃腹癰也雖能收斂至夏必變而成瘵症用參

復部

卜子四

各壹錢二劑諸證少退腹始微赤按之覺痛又二劑作痛又二劑腫痛脉滑數針出膿瘀更用大補湯精神飲食如故因遺精患處色黯用前藥加五味山菜山藥骨脂吳茱等劑澹口漸斂瘵證悉具其脉非洪大而數即微細如無唯專服獨參湯人乳汁少復良久仍脫余曰當備後事以俟火旺乃禱鬼神巫者歷言往事如見更示以方藥皆峻利之劑且言保其必生敬信服之後果歿經曰拘於鬼神者不可以言至德而况又輕信方藥於邪妄之人耶書此警後

八背部 十二

發背 種有

發背

或問背發疽有幾曰上中下三發俱在脊中屬督脉上發者傷於肺發於天柱骨下中發者傷於肝為對心發下發者傷於腎為對臍發皆由積熱怒氣所致初如粟米或麻或痒或拘急或不痛或大痛初覺便宜隔蒜灸之或汗或下或托量其虛實施治腦發背發在上者不可用木通恐導虛下元故也老弱者尤宜戒然三發背總要之地與他處不同尤所當謹微有痛痒宜速治之活命飲加羌活紫金丹勝金丹奪

背

小

二

命丹選用壯實者一粒金丹八陣散等下之老弱者
黃芪木香散十全大補湯托之
鬼遺云蜂疽發髀背起心俞及心包絡俞若肩髃二
十日不穴死十日可刺其色赤黑膿清者可治 或
問一人年六十背患疽狀如蜂房十日而平塌寒熱
痛楚殊甚飲食少進膨脹淋瀝何如曰此蜂窠發也
診其脉微而遲四肢厥冷為不足詢其先前過服耗
氣之劑又得暴怒用活命飲加參芪歸朮兼以烏藥
青皮木香間與紫金丹服之起發膿潰服十全大補
湯而愈

特疽發肺俞及肝俞不穴二十日死八日可刺其色
紅赤內隱起如椒子者死
陰陽二氣疽廣闊滿背或大或小不常腫熱脹大十
日可刺導引出膿不拘深淺多少發渴體倦十日外
不見膿不治 或問背上麻木不常時腫時塌忽軟
忽硬乍寒乍熱何如曰此名陰陽疽由七情內乖陰
陽不和也此證必大渴神清脉定者可治宜活命飲
加羌活或勝金丹奪命丹選用昏迷躁亂飲食不進
者死十日得黃白膿者可治數日無膿者死
筋疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有癰在

肥腸中九十日死

禽疽始發者如疹數十處如拳打之狀發寒齒噤如此者十四日死十日可刺導引膿出即愈或問背忽麻木拘急不痛十數處肉紫色如拳觸狀何如曰此名禽疽七日內寒熱口噤者死急服活命飲加羌活獨活勝金丹奪命丹得汗可治無汗不治神清脉和可治神昏脉躁或微或代者死漫腫不潰宜服臺閣紫微丸

或問背疽兩頭小四邊散何如曰此名兩頭發又名蒲天星一名廣綿背發因積熱蓄熱所致活命飲加

羌活紫金丹勝金丹壯實者八陣散一粒金丹下之腫高紅潤者生低陷黑暗者死

或問背脇之間三兩處發疽何如曰此名老鼠攢一名遊走血脾癰由怒氣積熱所致多發于足少陽足厥陰二經宜順氣清熱之劑服黃連解毒湯活命飲加黃連梔子及服紫金丹壯實者一粒金丹下之老弱者黃芪木香散內補十宣散選用七日不見膿黑陷及躁亂者死

或問背上生疽肉色不變麻木微痒頑如牛領之皮二三尺許何如曰此名竟體發亦名椒眼發由盛暑

時空腹感觸穢氣及憤怒積鬱所致宜活命飲加羌活或黃連解毒湯勝金丹烏金散選用壯實者八陣散一粒金丹下之七日内未成膿宜隔蒜灸灸而起發神清脉和者可治灸而不起腹脹神昏脉微或促或代者死服汗劑得汗者生無汗者死服補劑紅潤起發知痛者生膨脹不食乾枯黑陷者死或問背當心而痛麻木不常累累如彈如拳堅硬如石痛徹五内遍身拘急何如曰此名酒毒發疽由飢飽勞傷炙博厚味所致宜服黃連解毒湯加羌活乾葛或神效消毒散内疎黃連湯紫金錠勝金丹選用

神昏脉亂大渴狂言有妨飲食者死二便閉結者死有因寒變而内陷者用托裏温中湯或問背上細癩無數浸淫一二尺如湯火傷煩躁多渴何如曰此丹毒發疽也因服丹石剛劑所致紅潤者生紫黯者死惡證少者宜服黃連消毒散勝金丹國老膏惡證多神昏肌躁膨脹嘔噦者死或問背側生疽高二寸長尺許狀如黃瓜肉色不變何如曰此名黃瓜癰一名肉龜疼痛引心四肢麻木是也此證多不可治急服紫金丹勝金丹活命飲加羌活柴胡及奪命丹神仙追毒丸選用脉微自汗譫

語者死平塌黑色者獨薑散主之服臺閣紫微丸
 或問第九椎兩旁忽腫痛而無頭寒熱大作何如曰
 此名龍疽即中搭也屬太陽經由七情不和憤怒積
 熱所致壯實者急服一粒金丹或八陣散下之活命
 飲加柴胡羌活黃芩水酒各半煎服老弱者黃芪木
 香散內補十宣散十全大補湯選用色赤起發潤澤
 者可治色黑低陷惡心眩運大便滑泄小便如淋瀝
 語者死

因有
五種

鬼遺方云人生最可憂者發背也其種有五 一曰
 陽毒因風熱而有或患熱毒消渴或先患傷寒餘有

陽毒觸處畜積起于背脊脊之間不問椎數但從兩
 夾脊起止腰上滿背焮熱如炊之狀赤紫或紅如焰
 膿毒難成成後不止後痛不除驀忽數日之間復
 平如舊將謂腫消此是內攻肉陷不可療矣 二曰
 陰毒發背是氣冷而作初如黍米粒起情緒不快情
 情而痛直應前心心忪怔頭目昏重寒熱如瘡五七
 日後始發引攷腫開闊難收內積有膿深沉遲緩未
 透宜急以補氣湯藥內托外以抽膿藥貼之宜急見
 膿無膿即平愈末期 三曰有入多服金石燒煉之
 藥毒惡流滯成發背者初起如丹疹之狀藜藜漸開

背部

小十四

五

如湯火瘡面色如朱心膈煩躁多渴嗜冷其瘡難起
起卽驚入猶勝于陰陽二毒者緣此有解金石藥毒
湯散治其內也賴有根底分明亦須急療方安 四
曰人有患酒食毒發背者此疾非近得之乃臟腑久
積乘飢乘困食之便睡或多食酒肉冷熱粘滑肥鮮
熾膩未下胸膈房室不禁恣意當風取快脾臟氣虛
不能受乘發毒攻背兩夾脊不問椎數初起癰頭如
小彈子後大如拳堅如石痛遍四肢加之拘急口苦
舌乾腹急大小便澁十數日後頭面手足虛腫及臟
腑通泄如利內急痛者是其證也喜方腫引急用收

腫發穴潰膿湯藥內實外泄膿水不可放縱遲緩則
皮肉腐壞傷骨爛筋漸成膿多因而感邪內敗者死
矣 五曰人有冒山嵐瘴氣發背毒氣先在臟腑年
月浸遠氣血虛損衰弱初起腫色青黑如靴皮頑痺
痛深附筋骨徹髓按之如木石引手加深方覺似有
痛處至五七日毒氣浮淺腫高色變青白有如拳打
之狀寒戰似瘡及有風候頭動口偏手足厥逆眼黑
睛小白多而慢此內有邪氣相搏急破出清血三五
升方有黃膿白汁相和發泄其皮不寬不慢亦急脹
痛亦不住直至色退熱疼方瘡亦宜急急追趕膿與

毒氣外出無害

生

初患腫三日內灸者生 八日內膿成針烙導引者

生 未瘥慎勞力者生 慎忌食者生 慎喜怒者

生 懼腫猛療者生 急療者生 不諱發背者生

死

待膿自出不導引者死 未內攻而針烙用藥導引

者生內攻後導引針烙者死 腫焮熱痛方盛已前

療者生如過此後已內攻者死 膿成後不出不導

引但傳藥者死 如赤白痢氣急者是已內攻醫療

無益必死 癰不救十得五生疽不療十全死 輕

腫怕痛者必死 不遇良方者死 節候不依法者

必死 愚執恣意用性逸情者死

治

有發背癰有發背疽如毒氣勇猛而發如火焚茅易

于敗壞初發即可如黍米粒大三兩日漸赤引腫如

手掌面大五七日如碗面大即易為攻焮熱赤引如

火燒之狀浮面漸潰爛開內發腫如炊之狀外爛

皮肉如削去紫瘀膿汁多而腫不退疼亦不止發渴

發逆飲食不下嘔吐氣急浮淺開闊者尤宜發膿托

毒湯藥用之必愈陽證實也

其間有只如蓋面大者此非不大緣為毒氣深沉肉

虛毒氣近膜也此必內攻近入臟腑却外入四肢先

背疽背疽

小引四

十一

攻頭面虛浮後攻手面次攻兩足面腫名曰毒氣散
入四肢其人聲嘶氣脫眼睛黑小十指腫黑乾焦不
治陰證
虛也

陰陽

精要云凡癰疽初發腫硬高者而毒氣却淺此乃六
腑不和為癰其證屬陽勢雖急而易治若初發如粟
粒甚則如豆許與肉俱平或作赤色時覺痒痛痒時
慎勿抓破此乃五臟不調為疽其證屬陰蓋毒氣肉
畜已深勢雖緩而難治

發外

始發一粒如麻豆大身體便發熱生疽處腫大熱痛
此為發於外雖大如盆治之百耳百活陽證 或身

體不熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日後漸大不腫
不痛低陷而壞爛此為發於內雖神仙無如之何陰證

也虛
薛發背屬膀胱督脉經或陰虛火盛或醇酒厚味或
鬱怒房勞所致若腫赤痛甚脉洪數而有力熱毒之
證也為易治漫腫微痛色黯作渴脉洪數而無力陰
虛之證也為難治不腫不痛或漫腫色黯脉微細陽
氣虛甚也尤為難治 若腫焮作痛寒熱作渴飲食
如常此形氣病氣俱有餘也先用仙方活命飲後用
托裏消毒散解之

薛又云頭痛拘急乃表症先服
人參敗毒散一二劑如焮痛用

金銀花散或槐花酒神効托裏散
以清涼飲仙方活命飲苦參丸腫硬木悶疼痛發
熱煩躁飲冷便秘脈沉實者內疎黃連湯或清涼飲
大便已利欲得作膿用仙方活命飲托裏散蠟礬丸
外用神漫腫微痛或色不赤飲食少思此形氣病
氣俱不足也用托裏散調補之不作膿或膿成不
潰陽氣虛也托裏散倍加肉桂參芪膿出而反痛
或膿清稀氣血俱虛也八珍湯惡寒形寒或不收
斂陽氣虛也十全大補湯晡熱內熱或不收斂陰
血虛也四物加參朮作嘔欲嘔或不收斂胃氣虛
也六君加炮薑食少體倦或不收斂脾氣虛也補
中益氣加茯苓半夏肉赤而不斂血熱也四物加

山梔連翹肉白而不斂脾虛也四君加酒炒芍藥
木香小便頻數者腎陰虧損也加減八味丸若
初患未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內蘊也
仙方活命飲口乾飲熱漫腫微痛此元氣內虛也托
裏消毒散飲食少思肢體倦怠脾胃虛弱也六君子
湯如未應加薑桂其有死者乃邪氣盛真氣虛而不
能發出也在於旬餘之間見之若已發出用托裏
消毒散不腐潰用托裏散如不應急溫補脾胃其有
死者乃真氣虛而不能腐潰也在於二旬之間見之
若已腐潰用托裏散以生肌如不應急溫補脾胃

背脊痛
小兒

其有死者乃脾氣虛而不能收斂也在於月餘間見
之
外治法初起炊痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜
灸之痛者灸至不痛不痛者灸至痛毒隨火而散再
不痛者須明灸之謂不隔蒜但未潰以前皆可灸也更用
箍藥圍之若用烏金膏或拔生膏點患處數點尤好
間用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗瘡口處
候有瘡口即用紙作撚蘸烏金膏翠青錠入瘡內子尤妙
若有膿為脂膜間隔不出而作脹痛者宜用針引之
腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用豬蹄湯洗如膿稠

或痛飲食如常瘀肉自腐用消毒與托裏藥相兼服
之仍用前一膏塗貼若腐肉已離好肉宜速去之如
膿不稠不稀微有疼痛飲食不甘瘀肉腐遲更用桑
柴灸之多用托裏藥若瘀肉不腐或膿清稀不炊痛
者急服大補之劑亦用桑柴灸之以補接陽氣解散
鬱毒嘗觀患疽稍重未成膿者不用蒜灸之法及膿
熟不開或待腐肉自去多致不救大抵氣血壯實或
毒少輕者可假藥力或自腐潰怯弱之人熱毒中隔
內外不通不行針灸藥無全功矣然此證若膿已成
宜急開之否則重者潰通臟腑腐爛筋骨輕者延潰

良肉難於收功，因而不斂者多矣。大抵發背之患，其名雖多，唯陰陽二證為要。若發一頭或二頭，其形焮赤腫高，頭起疼痛，發熱為癰，屬陽，易治。若初起一頭如黍，不腫不赤，悶痛煩躁，大渴便秘，寐語齟齬，四五日間，其頭無數，其瘡口各含一粟，形似蓮蓬，名蓮蓬發。積日不潰，按之流血，至八九日，或數日，其頭成片，所含之物俱出，通結一衣，揭去又結，其口共爛為一瘡。其膿內攻，色紫黯，為疽，屬陰，難治。脈洪滑者，尚可沉細，尤難。如此惡證，惟隔蒜灸及塗烏金膏有效。凡人背近脊并髀皮裏有筋一層，患此證者，外皮

雖破難潰，以致內膿不出，令人脹痛苦楚，氣血轉虛，變證百出。若待自潰多致不救，必須開之，兼以托裏之劑，常治此證，以利刀剪之，尚不能去，以此堅物待其自潰，豈不反傷乎？非氣血壯實者，未見其能自潰也。

羅謙甫治一人，年踰六旬，冬至後數日，疽發背，五七日腫勢約七寸許，痛甚，瘍醫曰：膿已成，可開發矣。病者恐不從，三日醫曰：不開恐生變症，遂以燔針開之，膿泄痛減，以開遲之故。迨二日，變症果生，覺重如負石，熱如熯，火痛楚倍常。六脈沉數，按之有力。此膏梁

積執之變也邪氣酷熱固宜以寒藥治之時月嚴寒復有用寒遠寒之戒乃思內經云有假者反之雖違其時從證可也急作清涼飲子加黃連秤壹兩伍錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除月餘平復 虞奕侍郎背中發小瘡不悟只以藥調補數日不疼不痒又不滋蔓疑之呼外醫灸二百壯已無及此公平生不服藥一年來唯覺時時手脚心熱疾作不早治又誤服補藥何可久也蓋發背無補法諺云背無好瘡但發于正中者為真發背按謂發背無補法此非通論然一揚州名醫陽吉種瘕補而無通變者又不可不知

老其術甚著有一士人狀若有疾厭厭不聊莫能名其為何苦往謁之楊曰君熱證已極氣血銷鑠且盡自此三年當以疽死不可為也士人不樂而退聞茅山觀中一道士醫術通神但不肯以技自名未必為人致力士人心計交切乃衣僮僕之衣詣山拜之願執役左右道士喜留寘弟子中誨以誦經日夕祇事願指如意經兩月餘覺其與常隸別呼扣其所從來士人始再拜謝過以實告之道士笑曰世豈有醫不得之病當為子脉之又笑曰汝便可下山吾亦無藥與汝但日日買好梨啖一顆如生梨已盡則取乾者

泡湯飲之仍食其滓此疾自當平矣士人歸謹如其
戒經一歲復往揚州楊醫見之訝其顏貌腴澤脉息
和平謂之曰君必遇異人不然何以至此士人以告
楊立具衣冠焚香望茅山設拜蓋自咎其術之未至
也

寒
程明佑治槐充胡嫗年六十疽發背大如孟頭如蜂
窠嘔逆咽不下瘍醫藥之毒雖殺而胃寒泄程曰病
必分陰陽虛實胃傷于寒令人嘔逆溫補則榮衛充
而氣血周貫則毒隨膿出而肌肉漸生依方投藥四
五劑咽遂下嘔止已癰潰體漸平 陳斗崑治王主

政福建人背患一癰痛甚發咳逆十餘日水穀不下
脉伏如絕醫皆不治陳視之曰此寒涼過甚中氣下
陷以四君加薑桂三進而病如失癰亦漸愈 一男
子年五十餘形實色黑背生紅腫及髀骨下痛其脉
浮數而洪緊食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃
蘗生附瓜蒌子甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生
薑六貼而消此亦內托之意也 周許事觀患背癰
瘡口久不合召瘍醫徐廷禮療治恒以托裏十宣二
散與服不效徐謂周曰更請盛用美來共事料理吾
技窮矣既而盛至按脉用藥率與徐類但多加人參

五錢附子稍行功耳服後兩足俱暖自下而上謂其
子曰今之藥何神哉頓覺神爽快服之旬日而宿口
平復御醫王介之之內年四十背疽不起泄瀉作
嘔食少厥逆脉息如無屬陽氣虛寒用大補劑加附
子薑桂而不應再加附子二劑瀉愈甚更以大附子
一枚薑桂各三錢參芪歸朮各五錢作一劑腹內始
熱嘔瀉乃止手足漸溫脉息遂復更用大補而潰托
裏而斂十年後終患脾胃虛寒而歿
丹溪治一人背癰徑尺穴深而黑急作參芪歸朮膏
飲之三日略以艾芎湯洗之氣息奄奄然可飲食每

日作多肉餛飩大碗與之盡藥膏五斤餛飩三十碗
瘡漸合肉與餛飩補氣之有益者也 一老人背發
疽徑尺已與五香十宣散數十貼嘔逆不睡素有淋
病急以參芪歸朮膏以牛膝湯入竹瀝飲之淋止思
食盡藥四斤膿自涌出而愈 一人發背癰疽得肉
托十宣多矣見膿嘔逆發熱又用嘉禾散加丁香時
天熱脉洪數有力此潰瘍尤所忌然形氣實只與參
膏竹瀝飲之盡藥十五六斤竹百餘竿而愈後不戒
口味夏月醉坐水池中經年餘左脇旁生軟塊二年
後成疽自見脉證嘔逆如前仍服參膏等而安 汪

石山治一老人患背癰診視之其脉洪緩而濡癰腫如碗皮肉不變按之不甚痛微發寒熱乃語之曰若在膊胛經絡交錯皮薄骨高之處則難矣今腫去胛骨下掌許乃太陽經分尚可治遂用黃芪伍錢當歸羌活甘草節各壹錢先令以被蓋煖藥熟熱服令微汗寢熟腫消一暈五服遂安薛已治進士張德弘背疽微腫微赤飲食少思用托裏藥膿成而潰再用大補湯之類肉生而斂忽寒熱作嘔患處復腫其脉浮大按之若無形氣殊倦薛謂之曰此胃氣虛憊非瘡毒也彼云侵晨登廁觸穢始作仍用補藥而斂

一人大背患疽年餘瘡口甚小色黯陷下形氣怯弱脉浮緩而濇此氣血虛寒也用十全大補加附子少許數劑而元氣漸復却去附子又三十餘劑全愈一婦年五十餘四月初背當心生疽如粟大二三日漸大根盤五寸許不腫痛不寒熱薛診其脉微而沉曰脉病而形不病者是也實則痛虛則痒陰證陽證之所由分也不發不治潰而不斂亦不治乃與大補陽氣之劑色白而黯瘡勢如故至十一日復診其脉沉瘡勢不起神疲食減小便淋瀝乃與大補氣血加薑桂二劑瘡亦不起十五日因怒嘔瀉並作服大補藥

背脊 卷四
一劑瘡仍不起薛留藥二劑而去病者昏憤不服或
勸之省悟依方連進七劑十六日瘡起而潰色紅而
淡膿亦如之十九日薛至喜曰瘡已踰險處但元氣
消鑠尚可憂連與大補二十餘劑五月十一日病者
因勞自汗口乾舌強太陽髮際腦頂俱脹復延薛至
診之曰此氣血俱虛肝膽火上炎用補中益氣湯加
山梔芍藥頓愈但內熱少睡手足發熱不時霍熱用
逍遙散加山梔熱退復用歸脾湯瘡乃愈計瘡發及
歛四十二日 內翰楊臯湖 少叅史南湖之內
並見陽氣脫陷 一儒者年幾六旬仲冬背疽初起入房患

處黑死五寸許黯暈尺餘漫腫堅硬背如負石發熱
作渴小便頻數兩耳重聽揚手露體神思昏憤脈沉
而細右手為甚便秘廿七日計進飲食百餘碗腹內
如常眾欲通之薛曰所喜者此耳急用大劑六君子
加薑附肉桂三劑瘡始熾痛自後空心用前藥午後
以六味丸料加參芪歸朮五劑復用活命飲二劑針
出黑血甚多瘀膿少許背即輕軟仍用前藥便亦通
利薛他往四日神思復昏瘡仍黑陷飲食不進皆以
為殞薛以參芪歸朮各壹兩炮附子伍錢薑桂各貳
錢服之即索飲食并鴨子二枚自後日進前藥二劑

肉腐膿潰而愈。操江都憲伍松月背瘡愈後大熱
誤為實火用苦寒藥一鍾寒熱益甚欲冷水浴身脉
浮大按之全無薛曰此陽氣虛浮在肌表無根之火
也急用六君加附子一劑即愈。一男子背瘡不斂
焮腫發熱小便赤澀口乾體倦脉洪數而無力用參
芪歸朮熟地黃芍芍陳皮麥冬五味炙草肉桂補元
氣引虛火歸經脉證益甚此藥力未能及也再劑頓
退却去肉桂又數劑而愈此證因前失補元氣故耳
憲副陳魯山年伍旬居官勤苦勞傷元氣先口乾
舌燥後至丙午仲夏發背疽漫腫中央色黯四畔微

赤微痛脉舉之浮大按之微細左寸短而右寸若無
十餘日腫未全起薛曰此屬病氣元氣虛寒當捨時
從證朝用參芪薑桂歸朮陳皮半夏炙草溫補其陽
夕用加減八味丸滋其肝腎各四劑而腐潰但膿水
清稀盜汗自汗內熱晡熱脉浮而數改用八珍湯復
發熱而夜陽舉此腎虛而火妄動仍用加減八味丸
料煎服而安又因怒動肝火瘡出鮮血二盞許左關
弦數右關弦弱此肝木侮脾肝不能藏血脾不能統
血也用十全大補兼用前藥料各二劑而血止再用
前藥調理而痊。一人仲夏疽發背黯腫尺餘皆有

背疽背瘡
小斗四

小頭如鋪黍狀四日矣此真氣虛而邪氣實也外用
隔蒜灸內服活命飲一劑其邪稍退仍純補其氣又
將生脉散代茶飲瘡邪大退薛因他往三日復視之
飲食不入中央肉死大便秘結小便赤濁曰此間斷
補藥之過也蓋中央肉死毒氣盛而脾氣虛大便不
通胃氣虛而腸不能送小便赤濁脾土虛而火下陷
治亦難矣急用六君加當歸柴胡升麻飲食漸進大
便自通外用烏金膏塗中央三寸許四圍紅腫漸消
中央黑腐漸去乃敷當歸膏用地黃丸料與前藥間
服將百劑而愈 中翰鄭朝用背疽發熱吐痰飲食

無味肌肉不生瘡出鮮血薛曰此脾氣虧損不能攝
血歸源也法當補脾胃彼不信用消毒涼血加惡寒
嘔吐始悟其言用六君加炮薑半夏茯苓數劑諸證
悉退又令用十全大補瘡口漸斂後因飲食稍多泄
瀉成痢此脾胃虛寒下陷用補中益氣下四神丸而
痢止繼以六君子湯而瘡愈 封君表懷雪背疽發
熱作渴脉數無力用四物加黃蘗知母玄參山梔連
翹五味麥冬銀花脉證漸退又加白芷參芪腐肉悉
潰因停藥且勞熱渴仍作乃與參芪歸芷炙草山藥
山萸茯苓澤瀉肉桂而安又以六味地黃丸及十全

背疽背瘡

小兒

大補而斂 都憲周弘岡背患疽腫而不潰脉大而
浮此陽氣虛弱而邪氣壅滯也用托裏散倍用參芪
反內熱作渴脉洪大鼓指此虛火也用前散急加肉
桂脉證頓退仍用托裏而愈若以為熱毒而用寒藥
則誤矣 大僕王蔚塘初起因大勞又用十宣散之
類加喘渴內熱脉大無力此陽氣自傷不能升舉下
陷於陰分而為內熱也薛以補中益氣加酒炒芍藥
麥門冬五味子治之而愈 上舍張克恭患此內服
外敷皆寒涼敗毒遍身作痛欲嘔少食晡熱內熱惡
寒畏寒薛曰遍身作痛榮衛虛而不能營於肉裏也

欲嘔少食脾胃虛寒而不能消化飲食也內熱晡熱
陰血內虛而陽氣陷於陰分也惡寒畏寒陽氣虛弱
而不能衛於肌膚也此皆由脾胃之氣不足所致遂
用補中益氣湯諸證漸退又以十全大補湯腐肉漸
潰又用六君子湯加芎歸肌肉頓生而愈 儒者周
兩峰懷抱久鬱背脊患疽肝脈弦洪脾脉浮大按之
微細以補中益氣湯加桔梗貝母少用金銀花白芷
二劑肝脉頓退脾脉頓復乃以活命飲二劑膿潰腫
消肝脉仍弦此毒雖去而胃氣復傷仍用補中益氣
湯加茯苓半夏而愈 上舍蔡東之患此薛用托裏

之藥而潰瘡白尚未全斂時值仲冬兼咳嗽薛曰瘡口未斂脾氣虛也咳嗽不止肺氣虛也法當補其母一日與其全宴見息羊肉薛曰補可以去弱人參羊肉之類是也最宜食之遂每日不徹旬餘而瘡斂嗽亦頓愈矣 憲副屠九峰孟春患此色黯漫腫祚渴便數尺脉洪數此腎水乾涸當歿於火旺之際不信更用苦寒之藥復傷元氣以促其歿 京兆柴黼菴仲夏患之色黯微腫發熱煩躁痰涎自出小腹陰實手足逆冷右關浮澀兩尺微細薛曰此虛寒之證也王太僕云太熱而不熱是無火也決不能起懇求治

之遂用大溫補之藥一劑流涎雖止患處不起終不能救 顧包泉老醫年六十有五因盛怒疽發於背大如盂四圍色黑召瘍醫治之用冷藥敷貼敷已覺涼約曰七八日後爲用刀去瘀肉顧俟其去曰四圍色黑乃血滯更加冷藥非其治也乃更治熱敷藥去舊藥敷之覺甚痒終夜明日色鮮紅焮腫亦消惟中起數十孔如蜂房一日許又覺惡心作噦視一人頭如兩人頭自診曰此虛極證也用參附大劑進二服視已正矣不數日竟愈

血熱

一婦因得子遲服神仙聚寶丹背生癰甚危脉散大

而瀉急以加減四物湯百餘貼補其陰血幸其質厚
易于收斂

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

腰部 十三

○腰疽

或問十四椎旁腰腎之間發疽何如曰此名連腎發
即下搭也由房勞太過致傷腎水令人口乾寒熱大
作百節俱痛急服勝金丹黃芪肉托散活命飲加羌
活黃芪治之稍緩潰爛透膜者死若見咳嗽嘔噦腰
間似折不能俯仰飲食不納者死潰而膿水清稀腐
爛腥穢迷悶不醒厥逆者不治 一婦年逾七十腰
生一癰作癢異常疑蟲蝨所毒診脉浮數齊氏曰脉
浮數反惡寒者瘡也翌日復診脉乃弱予謂未潰而

腰部 瘡疽 小斗口

脉先弱何以收斂况大便不通則真氣已竭治之無功固請不得已用六君子加藿香神麩飲食漸進大便始通更用峻補之劑潰而膿清作渴再用參芪歸芩麥門五味而渴止喜曰可無虞矣予曰不然不能收斂先入之言也彼疑更醫果歿一人年十九腰間腫一塊無頭不痛色不變三月不潰飲食少思肌肉日瘦此氣搏腠理榮氣不行鬱而為腫名曰濕毒流注元戎曰若人飲食踈精神衰氣血弱肌肉瘦榮衛之氣短促而澀滯故寒搏腠理閉鬱為癰者當補以接虛怯之氣遂以十全大補湯加香附陳皮三十

餘劑始針出白膿二碗許仍用藥倍加參芪仍灸以豆豉餅漸愈彼乃惑于速効內服敗毒外貼涼藥反致食少膿稀患處色紫復請予治喜得精氣未衰仍以前藥加遠志貝母白斂百劑而愈此或久而不愈或膿水清稀當服內塞散及灸附子餅然後可愈一婦年踰二十腰間突腫寸許肉色不變微痛不潰發熱脉大此七情所損氣血凝滯遂道而然當益氣血開鬱結更以香附餅熨之使氣血充暢內自消散若爾雖潰亦無危不聽乃服十宣流氣之藥氣血愈虛潰出清膿不斂而死一婦產後腰間腫兩腿尤

甚此瘀血滯于經絡而然不早治必作癰遂與桃仁湯二劑稍愈更以沒藥丸數服而痊亦有惡血未盡臍腹刺痛或流注四肢或注股內痛如錐刺或兩股腫痛此由冷熱不調或思慮動作氣乃壅遏血蓄經絡而然宜沒藥丸治之亦有或因水濕所觸經水不行而腫痛者宜當歸丸治之凡惡血停滯為患匪輕治之稍緩則為流注為骨疽多致不救府庠彭碧溪患腰疽服寒涼敗毒之藥色黯不痛瘡頭如鋪黍背重不能安寢耳聾目白面色無神小便頻澀作渴迷悶氣粗短促脈浮數重按如無余先用滋

腎水之藥一劑少頃便利渴止背即輕爽乃砭去瘀血以艾半觔許明灸患處外敷烏金膏內服參芪歸朮肉桂等藥至數劑元氣稍復自疑肉桂辛熱一日不用手足並冷大便不禁仍加肉桂及補骨脂貳錢肉豆蔻壹錢大便如常其肉漸潰更用當歸膏以生肌肉八珍湯以補氣血而愈舉人顧東溪久作渴六月初腰患疽不慎起居瘡潰尺許色黯敗臭小便如淋唇裂舌刺七月終請治左尺洪數左關浮濇余謂先渴而患疽者乃腎水乾涸虛火上炎多致不起然膿水敗臭色黯不痛瘡口張大乃脾氣敗而肌肉

也小便如淋痰壅喘促口乾舌裂乃脾肺敗而腎
水絕也左尺洪數腎無所生也左關浮瀆肺尅脾也
况當金旺之際危殆速矣二日後果歿蓋此證既發
於外兩月方歿者乃元氣虛不能收斂也若豫為調
補使氣血無虧亦有得生者

或問一人患疽於腰膀之間肉色不變堅硬如石經
月不潰者何如曰此名石疽屬少陽陽明二經積熱
所致邪毒固結元氣不足故不能起發活命飲加獨
活羌活柴胡黃芪及紫金丹汗之壯實者入陣散一
粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯托之

若黑陷不起麻木不痛嘔噦不食精神昏亂脉散或
代者死神清脉和服臺閣紫微丸

○纏腰火丹

或問遶腰生瘡累累如珠何如曰是名火帶瘡亦名
纏腰火丹由心腎不交肝火內熾流入膀胱纏於帶
脉故如束帶急服內疎黃連湯壯實者一粒金丹下
之活命飲加苓連黃蘗外用清熱解毒藥敷之此證
若不早治纏腰已徧則毒由臍入膨脹不食而死
治蛇纏瘡

右用雄黃研為末以醋調塗仍用酒調服凡為蛇

傷及蜂蟄蜈蚣毒虫顛犬所傷皆可用之

此藥靈驗
 凡有蜂蟄蜈蚣毒虫咬傷者
 用此藥水塗之
 立見功效
 此藥水乃用
 黃連一斤
 甘草一斤
 白芷一斤
 薄荷一斤
 煎取汁
 用酒調服
 此藥水
 治一切
 瘡毒
 疔瘡
 疥癩
 濕疹
 等症
 功效如神
 凡有患此症者
 宜早服此藥
 以免延誤
 此藥水
 乃居家旅行
 必備之良藥
 也

